

Λογικός Σχεδιασμός

Εισαγωγή

Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό»

- Μη τυπικές γενικές κατευθύνσεις
- Θεωρία **κανονικών μορφών** η οποία βασίζεται στην έννοια των **συναρτησιακών εξαρτήσεων**

Γενικές Κατευθύνσεις

1. Σημασιολογία
2. Ελάττωση πλεονασμού
3. Ελάττωση τιμών null
4. Μη πλασματικές πλειάδες

Σημασιολογία

- Εύκολη η εξήγηση της σημασίας του
- Αποφυγή συνδυασμού γνωρισμάτων από πολλές οντότητες και συσχετίσεις στην ίδια σχέση

Ταινία

| | | | |
|---------------|-------------|----------|-------|
| <u>Τίτλος</u> | <u>Έτος</u> | Διάρκεια | Είδος |
|---------------|-------------|----------|-------|

Παίζει

| | | |
|--------------|---------------|-------------|
| <u>Όνομα</u> | <u>Τίτλος</u> | <u>Έτος</u> |
|--------------|---------------|-------------|

Ηθοποιός

| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| <u>Όνομα</u> | Διεύθυνση | Έτος-Γέννησης |
|--------------|-----------|---------------|

Πλεονασμός (επανάληψη πληροφορίας)

Ταινία

| | | | | |
|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|
| <u>Τίτλος</u> | <u>Έτος</u> | Διάρκεια | Είδος | <u>Όνομα-Ηθοποιού</u> |
|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|

εδώ βοηθούν οι συναρτησιακές εξαρτήσεις

Εισαγωγή

- Για την εισαγωγή μιας νέας ταινίας πρέπει να εισάγουμε τουλάχιστον έναν ηθοποιό (τιμή null;)
- Για την εισαγωγή ενός ηθοποιού στην ταινία πρέπει να επαναλάβουμε τα γνωρίσματα (διάρκεια, είδος) της ταινίας

Διαγραφή

- Τι γίνεται αν διαγράψουμε και τον τελευταίο ηθοποιό
- Διαγραφή μιας ταινίας;

Πλεονασμός (επανάληψη πληροφορίας)

Ταινία

| | | | | |
|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|
| <u>Τίτλος</u> | <u>Έτος</u> | Διάρκεια | Είδος | <u>Όνομα-Ηθοποιού</u> |
|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|

Τροποποίηση


- Τι γίνεται αν θελήσουμε να τροποποιήσουμε τη διάρκεια μιας ταινίας;

Σύνοψη Προβλημάτων Λόγω Πλεονασμού

- ✓ Πλεονασμός στην αποθήκευση
- ✓ Προβληματική ενημέρωση
- ✓ Προβληματική εισαγωγή
- ✓ Προβληματική διαγραφή


Αποφυγή τιμών null

Ηθοποιός



Ηθοποιός

Ζευγάρι-Ηθοποιών



Αποφυγή δημιουργίας πλασματικών πλειάδων

(αδυναμία αναπαράστασης συγκεκριμένης πληροφορίας)

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------|-------|
| Ταινία | <u>Τίτλος</u> | <u>Έτος</u> | Διάρκεια | Είδος |
|---------------|---------------|-------------|----------|-------|

| | | |
|---------------|---------------|-----------------------|
| Παίζει | <u>Τίτλος</u> | <u>Όνομα-Ηθοποιού</u> |
|---------------|---------------|-----------------------|

Χάνουμε πληροφορία δεν μπορούμε να βρούμε ποιος ηθοποιός σε ποια ταινία

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|
| Ταινία | <u>Τίτλος</u> | <u>Έτος</u> | Διάρκεια | Είδος | <u>Όνομα-Ηθοποιού</u> |
|---------------|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|

Γενικός Αλγόριθμος Σχεδιασμού

Ο τρόπος που σχεδιάζαμε ένα σχήμα ΒΔ μέχρι τώρα:

- ✓ από το εννοιολογικό στο σχεσιακό μοντέλο

Θα δούμε ένα **γενικό τυπικό τρόπο** κατασκευής του σχήματος

Γενικά:

- Ξεκινάμε από το **καθολικό σχήμα** (που περιέχει όλα τα γνωρίσματα)
- **Διαδοχικές διασπάσεις** έτσι ώστε τα σχήματα που προκύπτουν να ικανοποιούν κάποιες ιδιότητες (με βάση συναρτησιακές εξαρτήσεις)

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Εισαγωγή

Τι είναι;

Εξαρτήσεις ανάμεσα σε σύνολα από γνωρίσματα

Συμβολισμός

S1 → **S2** (όπου S1, S2 σύνολα γνωρισμάτων)

Τι σημαίνει:

Αν ίδιες τιμές στα γνωρίσματα του S1 \Rightarrow ίδιες τιμές στα γνωρίσματα του S2

Παράδειγμα

Παράδειγμα: Σχήμα Σχέσης R(A, B, C, D) (Υπενθύμιση συμβολισμού)

Στιγμιότυπο, $r(R)$

| | A | B | C | D |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| r1 | a_1 | b_1 | c_1 | d_1 |
| r2 | a_1 | b_2 | c_1 | d_2 |
| r3 | a_2 | b_3 | c_2 | d_3 |
| r4 | a_3 | b_3 | c_2 | d_4 |

Συμβολισμός

$$r1[A] = a_1$$

$$r2[BC] = b_2 c_1$$

Ορισμός

Έστω ένα σχήμα σχέσης $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$.

Θα συμβολίζουμε με $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ το σύνολο των γνωρισμάτων της R .

Έστω $X \subseteq R$ και $Y \subseteq R$, μια **συναρτησιακή εξάρτηση (functional dependency)**

$X \rightarrow Y$ ισχύει στο σχήμα R

αν για κάθε σχέση $r(R)$, για κάθε ζεύγος πλειάδων t_1 και t_2 της r , ισχύει $t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$ (If $t_1[X] = t_2[X]$ then $t_1[Y] = t_2[Y]$)

Με απλά λόγια, μια συναρτησιακή εξάρτηση $X \rightarrow Y$ μας λέει ότι

αν οποιεσδήποτε δυο πλειάδες μιας σχέσης της R συμφωνούν (έχουν την ίδια τιμή) στα γνωρίσματα $X \subseteq R$ τότε συμφωνούν (έχουν την ίδια τιμή) και στα γνωρίσματα $Y \subseteq R$.

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Αντί $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \rightarrow \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ γράφουμε

$$A_1 A_2 \dots A_n \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m$$

✓ **Ισχύουν στο σχήμα** - δηλαδή για όλες τις πιθανές σχέσεις (πλειάδες)

Παράδειγμα: Ποιες (μη τετριμμένες) συναρτησιακές εξαρτήσεις ικανοποιεί η παρακάτω σχέση – δεν ξέρουμε αν ισχύουν στο σχήμα

Μπορούμε όμως να πούμε ποιες **δεν ισχύουν**

| A | B | C | D |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a ₁ | b ₁ | c ₁ | d ₁ |
| a ₁ | b ₂ | c ₁ | d ₂ |
| a ₂ | b ₃ | c ₂ | d ₃ |
| a ₃ | b ₃ | c ₂ | d ₄ |

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

- Το Y εξαρτάται συναρτησιακά από το X
- Γιατί καλούνται συναρτησιακές;
- $K \subseteq R$ κλειδί της R αν $K \rightarrow ?$
 - Υπενθύμιση: R είναι το σύνολο των γνωρισμάτων του σχήματος
 - Μια γενίκευση της έννοιας του κλειδιού

Παρατήρηση

$$A_1A_2 \dots A_n \rightarrow B_1 \text{ και } A_1A_2 \dots A_n \rightarrow B_2 \Leftrightarrow A_1A_2 \dots A_n \rightarrow B_1B_2$$

Παράδειγμα I (φυσική σημασία)

Όπως και τα κλειδιά, οι συναρτησιακές εξαρτήσεις προκύπτουν από τη φυσική περιγραφή του προβλήματος, δηλαδή από τον πραγματικό κόσμο

Έστω το παρακάτω σχεσιακό σχήμα:

Εγγραφή(Μάθημα, Φοιτητής, Ώρα&Μέρα, Αίθουσα, Βαθμός)

(συντομογραφία) **E(M, Φ, Ω, Α, Β)**

Ποιες συναρτησιακές εξαρτήσεις εκφράζουν τα 1 έως 4

1. Τα μαθήματα προσφέρονται μόνο μια φορά σε μια συγκεκριμένη ώρα&μέρα και αίθουσα.
2. Οι φοιτητές δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα (δηλαδή, την ίδια ώρα&μέρα) σε δυο διαφορετικές αίθουσες
3. Δε γίνεται να έχουμε δυο μαθήματα ταυτόχρονα (την ίδια ώρα&μέρα) στην ίδια αίθουσα
4. Ένας φοιτητής παίρνει μόνο ένα βαθμό σε κάθε μάθημα

Ποιο (ποια) είναι το κλειδί αν ισχύουν τα 1 έως 4

Τι σημαίνει

1. $\Phi \rightarrow M$
2. $MB \rightarrow \Phi$

Παράδειγμα II (φυσική σημασία)

Παράδειγμα: Στο παρακάτω σχήμα Λογαριασμός θεωρούμε ότι ένας λογαριασμός μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από έναν πελάτη και ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλούς λογαριασμούς. Ποιες άλλες (εκτός του κλειδιού) συναρτησιακές εξαρτήσεις μπορεί να ισχύουν αλλά δε φαίνονται στο παρακάτω σχήμα;

Λογαριασμός

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|---------------------|
| Όνομα-Υποκαταστήματος | <u>Αριθμός-Λογαριασμού</u> | Ποσό | <u>Όνομα-Πελάτη</u> |
|-----------------------|----------------------------|------|---------------------|

Παράδειγμα: Όμοια στο παρακάτω σχήμα, ένας Πελάτης πολλά δάνεια και ένα Δάνειο από παραπάνω από έναν πελάτη και ένας πελάτης δίνει μόνο μια διεύθυνση

Πελάτης

| | | | |
|---------------------|------|------|------------------------|
| <u>Όνομα-Πελάτη</u> | Οδός | Πόλη | <u>Αριθμός-Δανείου</u> |
|---------------------|------|------|------------------------|



Διεύθυνση πελάτη

- ✓ Σημείωση: Στα παραπάνω σχεσιακά μοντέλα, με τα κλειδιά εκφράζεται μόνο ένα υποσύνολο των περιορισμών
- ✓ Διαισθητικά, οι δύο παραπάνω σχεδιασμοί δεν είναι «καλοί», γιατί;

Τετριμμένη Συναρτησιακή Εξάρτηση

Τετριμμένες (trivial) εξαρτήσεις: ισχύουν για όλα τα σχήματα

Παράδειγμα: $A \rightarrow A$ ή $AB \rightarrow B$

Γενικά,

$X \rightarrow Y$ **τετριμμένη**, όταν $Y \subseteq X$

Περιορισμοί Σχήματος

- ✓ Οι συναρτησιακές εξαρτήσεις ορίζονται στο **σχήμα** μιας σχέσης, εκφράζουν περιορισμούς ορθότητας (integrity constraint)
- ✓ Ένα σύνολο από συναρτησιακές εξαρτήσεις F ισχύει σε ένα σχήμα, όλα τα νόμιμα (legal) στιγμιότυπα πρέπει να ικανοποιούν το σύνολο των εξαρτήσεων
- ✓ Έλεγχος αν μια σχέση (στιγμιότυπο) ικανοποιεί το σύνολο F

Κανόνες Συμπερασμού (Inference Rules)

Πως μπορούμε να συνάγουμε νέες εξαρτήσεις από ένα δεδομένο σύνολο εξαρτήσεων

$F \models X \rightarrow Y$: η συναρτησιακή εξάρτηση $X \rightarrow Y$ **συνάγεται** (inferred/implies) από το σύνολο εξαρτήσεων F

Η $X \rightarrow Y$ ισχύει σε κάθε στιγμιότυπο που ικανοποιεί το σύνολο των εξαρτήσεων στο F

F^+ : **κλειστότητα (εγκλεισμός)** του F (closure): σύνολο όλων των συναρτησιακών εξαρτήσεων που συνάγονται από το F

Κανόνες Συμπερασμού - για τη δημιουργία εξαρτήσεων

Κανόνες Συμπερασμού (Inference Rules)

1. Ανακλαστικός Κανόνας (reflexivity)

Αν $X \supseteq Y$, τότε $X \rightarrow Y$

2. Επαυξητικός Κανόνας (augmentation)

$\{X \rightarrow Y\} \quad | = \quad XZ \rightarrow YZ$

3. Μεταβατικός Κανόνας (transitivity)

$\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \quad | = \quad X \rightarrow Z$

Κανόνες του Armstrong: *βάσιμοι* (sound) δε δίνουν λανθασμένες εξαρτήσεις και *πλήρεις* (complete) μας δίνουν όλο το F^+

Κανόνες Συμπερασμού

$$\{X \rightarrow Y\} \quad | = \quad XZ \rightarrow YZ$$

Επαυξητικός Κανόνας

Απόδειξη των 3 κανόνων με βάση τον ορισμό

Απόδειξη

(με επαγωγή σε άτοπο:) έστω ότι σε κάποιο στιγμιότυπο της r ισχύει

$$X \rightarrow Y \text{ (1) αλλά όχι } XZ \rightarrow YZ \text{ (2)}$$

Από (2 & ορισμό), υπάρχουν δυο πλειάδες, t_1 και t_2 , τέτοιες ώστε $t_1[XZ] = t_2[XZ]$ (3)

$$\text{και } t_1[YZ] \neq t_2[YZ]$$

Από (3), $t_1[X] = t_2[X]$ (4) και $t_1[Z] = t_2[Z]$ (5)

Από (1) και (4), $t_1[Y] = t_2[Y]$ (6)

Από (5) και (6), $t_1[YZ] = t_2[YZ]$ Άτοπο!

Κανόνες Συμπερασμού

Επιπρόσθετοι κανόνες

4. Ενωτικός Κανόνας (union)

$$\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \quad | = \quad X \rightarrow YZ$$

5. Διασπαστικός Κανόνας (decomposition)

$$\{X \rightarrow YZ\} \quad | = \quad X \rightarrow Y$$

6. Ψευδομεταβατικός Κανόνας

$$\{X \rightarrow Y, YZ \rightarrow W\} \quad | = \quad XZ \rightarrow W$$

Κανόνες Συμπερασμού

Ενωτικός Κανόνας

$$\{X \rightarrow Y (1), X \rightarrow Z (2)\} \quad | \quad = X \rightarrow YZ$$

Απόδειξη των επιπλέον κανόνων με βάση τον ορισμό ή/και των κανόνων του Amstrong

Απόδειξη (με χρήση των κανόνων του Amstrong)

$$(2) + \text{Επαυξ. } XY \rightarrow YZ \quad (3)$$

$$(1) + \text{Επαυξ. } X \rightarrow XY \quad (4)$$

$$(3) (4) \text{ Μεταβ. } X \rightarrow YZ$$

Ανακλαστικός Κανόνας

Αν $X \supseteq Y$, τότε $X \rightarrow Y$

Επαυξητικός Κανόνας

$$\{X \rightarrow Y\} \quad | \quad = XZ \rightarrow YZ$$

Μεταβατικός Κανόνας

$$\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \quad | \quad = X \rightarrow Z$$

Κανόνες Συμπερασμού (σύνοψη)

1. Ανακλαστικός Κανόνας $\text{An } X \supseteq Y, \text{ τότε } X \rightarrow Y$
2. Επαυξητικός Κανόνας $\{X \rightarrow Y\}$ συνάγει $XZ \rightarrow YZ$
3. Μεταβατικός Κανόνας $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\}$ συνάγει $X \rightarrow Z$
4. Ενωτικός Κανόνας $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\}$ συνάγει $X \rightarrow YZ$
5. Διασπαστικός Κανόνας $\{X \rightarrow YZ\}$ συνάγει $X \rightarrow Y$
6. Ψευδομεταβατικός Κανόνας $\{X \rightarrow Y, YZ \rightarrow W\}$ συνάγει $XZ \rightarrow W$

Παράδειγμα

Έστω $R = \{A, B, C, G, H, I\}$ και $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H\}$

Παραδείγματα συναρτησιακών εξαρτήσεων που συνάγονται από το F

- $A \rightarrow H$
- $CG \rightarrow HI$
- $AG \rightarrow I$

(α) Υπάρχει τρόπος/αλγόριθμος να τις υπολογίσουμε όλες;

(β) Πως μπορούμε να υπολογίσουμε το κλειδί;

Εγκλεισμός Γνωρισμάτων

X^+ : κλειστότητα (εγκλεισμός) (closure) ενός συνόλου X από γνωρίσματα από το F : σύνολο όλων των γνωρισμάτων που εξαρτώνται συναρτησιακά από το X μέσω του F

Υπολογισμός του X^+

Result := X

while (αλλαγή στο Result)

 Για κάθε συναρτησιακή εξάρτηση: $Y \rightarrow Z \in F$

 Αν $Y \subseteq \text{Result}$, Result := Result \cup Z

Παράδειγμα

Έστω $R = \{A, B, C, G, H, I\}$ και $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H\}$

Υπολογισμός του $\{A\}^+$, $\{B\}^+$, $\{A, G\}^+$

Εγκλεισμός Γνωρισμάτων

- Είναι ο αλγόριθμος σωστός
 - (α) Για κάθε $Y \in \text{Result}$, ισχύει $Y \in X^+$
 - (β) Για κάθε $Y \in X^+$, ισχύει $Y \in \text{Result}$
- Πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης

Παράδειγμα I

$R(A, B, C, D) \quad F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

1. Δείξουμε αν μια συναρτησιακή εξάρτηση ισχύει (συνάγεται από την F)

$C \rightarrow A ?$

$A \rightarrow D ?$

$AB \rightarrow D ?$

2. Υπολογισμός κλειδιών

3. Υπολογίσουμε το F^+

Παράδειγμα II

$R(A, B, C, D, E) \quad F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow AD, B \rightarrow ED, AD \rightarrow E\}$

1. Υπολογίστε το

A^+, B^+, C^+, D^+, E^+

2. Υποψήφια κλειδιά;

Κάλυμμα

Στόχος η απλοποίηση ενός συνόλου συναρτησιακών εξαρτήσεων χωρίς να μεταβάλλουμε την κλειστότητά του

Έστω δυο σύνολα συναρτησιακών εξαρτήσεων E και F

Λέμε ότι το F **καλύπτει** το E (ή το E καλύπτεται από το F), αν κάθε ΣE στο E , ανήκει στο F^+ (δηλαδή, συνάγεται από το F) (ισοδύναμα, αν $E \subseteq F^+$)

Δυο σύνολα συναρτησιακών εξαρτήσεων E και F είναι **ισοδύναμα**

ανν $E^+ = F^+$.

(δηλαδή, αν το E καλύπτει το F και το F καλύπτει το E)

Κάλυμμα

- Πως μπορούμε να υπολογίσουμε αν ένα σύνολο F καλύπτει ένα σύνολο E ;
- Πως μπορούμε να υπολογίσουμε αν ένα σύνολο F είναι ισοδύναμο με ένα σύνολο E ;

Παράδειγμα

$$F1 = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$$

$$F2 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C\}$$

$$F3 = \{A \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$$

F1 καλύπτει το F3;

F3 καλύπτει το F1;

F1 ισοδύναμο του F3;

F2 καλύπτει το F3;

Άσκηση

$R(A, B, C, D, E) \quad F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow E, AD \rightarrow E\}$

1. Ισχύει $DC \rightarrow E$?
2. Υπολογίστε τα A^+ , B^+ , C^+ , D^+ , E^+
3. Υποψήφια κλειδιά;
4. Δώστε ένα στιγμιότυπο που να παραβιάζει **μόνο** την $AD \rightarrow E$

Ελάχιστο Κάλυμμα

Ένα σύνολο F συναρτησιακών εξαρτήσεων είναι **ελάχιστο** αν:

1. κάθε ΣΕ στο F έχει *ένα μόνο γνώρισμα* στο δεξιό της μέρος
2. δε μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια ΣΕ $X \rightarrow Z$ στο F με μια ΣΕ $Y \rightarrow Z$ τέτοια ώστε $Y \subset X$ και να πάρουμε ένα σύνολο ισοδύναμο του F (δηλαδή, δεν υπάρχει *περιττό γνώρισμα* στο α.μ της συναρτησιακής εξάρτησης)
3. δε *μπορούμε να αφαιρέσουμε* μια ΣΕ από το F και να πάρουμε ένα σύνολο ισοδύναμο του F (δηλαδή, δεν υπάρχει περιττή ΣΕ)

Ελάχιστο κάλυμμα F_{\min} της F : ελάχιστο σύνολο από ΣΕ που είναι ισοδύναμο με την F

Αλγόριθμος Υπολογισμού Ελάχιστου Καλύμματος

1. Αντικατέστησε τις συναρτησιακές εξαρτήσεις

$$X_1 \rightarrow Y_1 Y_2 \text{ με } X_1 \rightarrow Y_1 \text{ και } X_1 \rightarrow Y_2.$$

2. Για κάθε ΣΕ

(i) Βρες τα περιττά γνωρίσματα στο α.μ., αφάιρεσε τα

(ii) Έλεγξε αν είναι περιττή, αν ναι αφάιρεσέ τη

Περισσότερα Γνωρίσματα

Περισσότερα γνωρίσματα: γνωρίσματα που αν αφαιρεθούν δεν επηρεάζουν τη κλειστότητα (δηλαδή προκύπτει ισοδύναμο σύνολο)

Για παράδειγμα: το γνώρισμα $AB \rightarrow C$ το A είναι περιττό στην εξάρτηση (στο αριστερό μέρος) αν

$$F \text{ ισοδύναμο } \underbrace{(F - \{AB \rightarrow C\}) \cup \{B \rightarrow C\}}_{F'}$$

Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το A από την ΣΕ, το σύνολο F' που προκύπτει είναι ισοδύναμο με το αρχικό σύνολο F

- ✓ Προφανώς το F' καλύπτει το F , άρα αρκεί να ελέγξουμε αν το F καλύπτει το F'

Παράδειγμα (περιττού γνωρίσματος στο αριστερό μέρος)

$R(A, B, C, D, E) \quad F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow AD, B \rightarrow ED, AD \rightarrow E\}$

Είναι κάποιο γνώρισμα της $AD \rightarrow E$ περιττό;

-- A περιττό?

$F' = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow AD, B \rightarrow ED, D \rightarrow E\}$

F' ισοδύναμο με F ;

ανν (F' καλύπτει F) και (F καλύπτει F')

προφανώς, F' καλύπτει F (επαυξητικός κανόνας)

άρα αρκεί να ελέγξουμε αν (F καλύπτει F')

αν $D \rightarrow E \in F^+$

-- D περιττό αν $A \rightarrow E \in F^+$

Περισσότερο Γνώρισμα

Γενικεύοντας:

Έστω ένα σύνολο F συναρτησιακών εξαρτήσεων και η ΣΕ $X \rightarrow Y \in F$

Το γνώρισμα $A \in X$ είναι **περισσότερο στο X** αν

F καλύπτει το $(F - \{X \rightarrow Y\}) \cup \{(X - A) \rightarrow Y\}$

- Πως θα υπολογίσουμε αν ένα γνώρισμα στο **α.μ.** μιας ΣΕ είναι περισσότερο; Θα πρέπει να δείξουμε ότι οι ΣΕ του F' ανήκουν στο F^+ , δηλαδή:

Υπολόγισε το $(X - \{A\})^+$ με βάση τις ΣΕ του συνόλου F :

Το A είναι περισσότερο αν το Y ανήκει στο $(X - \{A\})^+$ στο F

Περιττή Εξάρτηση

- Πως θα υπολογίσουμε αν μια ΣΕ $X \rightarrow B$ (με ένα γνώρισμα στο δ.μ.) είναι περιττή;

Υπολογίζουμε το $(X)^+$ χρησιμοποιώντας το $F - \{X \rightarrow B\}$

Περιττό αν το B ανήκει στο $(X)^+$

Αλγόριθμος Υπολογισμού Ελάχιστου Καλύμματος

1. Αντικατέστησε τις συναρτησιακές εξαρτήσεις

$$X_1 \rightarrow Y_1 Y_2 \text{ με } X_1 \rightarrow Y_1 \text{ και } X_1 \rightarrow Y_2.$$

2. Για κάθε ΣΕ

(i) Βρες τα περιττά γνωρίσματα στο α.μ.

Α περιττό στο $X (X \rightarrow Y)$: υπολόγισε το $(X - \{A\})^+$

(ii) Έλεγξε αν είναι περιττή, αν ναι αφάιρεσε τη

Εξάρτηση $X \rightarrow B$ περιττή: υπολόγισε το X^+

Παράδειγμα

Έστω $R(A, B, C)$ και $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$.

Βρείτε το F_{\min} .

Παράδειγμα

Έστω $R(A, B, C)$ και $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$. Βρείτε το F_{\min} .

Μετά το βήμα 1: $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$

Βήμα 2: Εξέταση αν το A είναι περιττό στο $AB \rightarrow C$, υπολογίζοντας το $(B)^+$

είναι περιττό

Νέο σύνολο: $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C, B \rightarrow C\}$

Βήμα 3: Εξέταση αν η ΣΕ $A \rightarrow B$ είναι περιττή όχι

Εξέταση αν η ΣΕ $A \rightarrow C$ είναι περιττή ναι

Νέο σύνολο: $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

Εξέταση αν η ΣΕ $B \rightarrow C$ είναι περιττή όχι

Αποτέλεσμα: $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

Άσκηση

$R(A, B, C, D, E) \quad F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow AD, B \rightarrow ED, AD \rightarrow E\}$

Ποιο είναι το ελάχιστο κάλυμμα της F ;

Ελάχιστο Κάλυμμα

Παρατηρήσεις

- Το ελάχιστο κάλυμμα *δεν* είναι μοναδικό
- Το βήμα (i) πρέπει να προηγηθεί του βήματος (ii), δηλαδή πρέπει πρώτα να βρούμε τα περιττά γνωρίσματα στο α.μ. και μετά τις περιττές εξαρτήσεις

Σύνοψη

Τι είδαμε:

- Ορισμό συναρτησιακής εξάρτησης
- Κανόνες συμπερασμού συναρτησιακών εξαρτήσεων
- Κλειστότητα γνωρίσματος
- Ισοδυναμία συνόλου εξαρτήσεων
- Ελάχιστο κάλυμμα

Ερωτήσεις;

Διάσπαση

Αλγόριθμος Σχεδιασμού

Ο τρόπος που σχεδιάζαμε ένα σχήμα ΒΔ μέχρι τώρα:

από το εννοιολογικό στο σχεσιακό μοντέλο

Θα δούμε ένα **γενικό θεωρητικό (formal) τρόπο** κατασκευής του σχήματος

Γενικά:

- Ξεκινάμε από το **καθολικό σχήμα** (που περιέχει όλα τα γνωρίσματα)
- Διαδοχικές διασπάσεις έτσι ώστε τα σχήματα που προκύπτουν να ικανοποιούν κάποιες ιδιότητες (να είναι σε κάποια κανονική μορφή)

-- top-down τεχνική

Αλγόριθμος Σχεδιασμού

Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον τρόπο και για να «διασπάσουμε» μια «προβληματική» σχέση που προέκυψε από την μετατροπή του εννοιολογικού σχεδιασμού

Μειονέκτημα των διασπάσεων:

μπορεί να απαιτεί συνενώσεις (join) για να απαντηθούν ερωτήματα ή για να ελεγχθούν εξαρτήσεις -> αποδοτικότητα του συστήματος

Αλγόριθμος Σχεδιασμού

Αποσύνθεση/Διάσπαση (decomposition)

Αλγόριθμος σχεδιασμού

1. Αρχικά ένα καθολικό (universal) σχήμα σχέσης που περιέχει όλα τα γνωρίσματα
2. Προσδιορισμός των συναρτησιακών εξαρτήσεων
3. Διάσπαση σε ένα σύνολο από σχήματα σχέσεων που ικανοποιούν κάποιες ιδιότητες

Σχεδιασμός

Διάσπαση καθολικού σχήματος

Επιθυμητές ιδιότητες

1. όχι απώλειες στη συνένωση
2. διατήρηση εξαρτήσεων
3. όχι επανάληψη πληροφορίας λόγω ΣΕ



Κανονικές μορφές

Παράδειγμα Διάσπασης Σχήματος

Καθολικό Σχήμα: $R = \{\text{Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος, Όνομα-Ηθοποιού, Διεύθυνση, Έτος-Γέννησης}\}$

Σύνολο ΣΕ που ισχύουν στο πρόβλημα:

$F = \{\text{Τίτλος Έτος} \rightarrow \text{Είδος, Διάρκεια, Όνομα Ηθοποιού} \rightarrow \text{Διεύθυνση, Έτος Γέννησης}\}$

Πιθανή διάσπαση:

$R_1 = \{\text{Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος}\}$

$R_2 = \{\text{Τίτλος, Έτος, Όνομα-Ηθοποιού, Διεύθυνση, Έτος-Γέννησης}\}$

- ✓ Ποια είναι μια καλή διάσπαση; Πως μπορούμε να πάρουμε την αρχική σχέση;
- ✓ Μπορούμε να διασπάσουμε την R_2 με τον ίδιο τρόπο.

Τυπικός Ορισμός Διάσπασης

Αρχικά ένα καθολικό σχήμα $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.

Διάσπαση/αποσύνθεση (decomposition) του σε δύο σχήματα

$$R_1 = \{B_1, B_2, \dots, B_m\} \text{ και } R_2 = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$$

τέτοια ώστε:

1. $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\} \cup \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ (διατήρηση γνωρισμάτων)
[γνωρίσματα]
2. Οι πλειάδες της $r_1(R_1)$ είναι η *προβολή των πλειάδων της $r(R)$* στα $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$
[πλειάδες]
3. Οι πλειάδες της $r_2(R_2)$ είναι η *προβολή των πλειάδων της $r(R)$* στα $\{C_1, C_2, \dots, C_k\}$
[πλειάδες]

Παράδειγμα

Έστω το (καθολικό) σχήμα $R(A, B, C)$ και διάσπαση σε $R_1(A, B)$ και $R_2(B, C)$

Τα αντίστοιχα στιγμιότυπα (σχέσεις) (συμβολισμός $r(R)$ ή r)

| $r(R)$ | $r_1(R_1)$ | $r_2(R_2)$ |
|--------|------------|------------|
| A B C | A B | B C |
| 1 3 3 | 1 3 | 3 3 |
| 2 3 4 | 2 3 | 3 4 |

Μπορούμε να πάρουμε το αρχικό στιγμιότυπο;

Φυσική συνένωση $r_1 * r_2$;

Διάσπαση

γνωρίσματα

Έστω ένα σχεσιακό σχήμα R . Ένα σύνολο από σχεσιακά σχήματα $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ είναι μια **διάσπαση** του R αν

$$R = R_1 \cup R_2 \dots \cup R_n$$

Δηλαδή, $\forall i = 1, \dots, n \quad R_i \subseteq R$

στιγμιότυπα

Έστω $r(R)$ και $r_i = \pi_{R_i}(r)$, $\forall i = 1, \dots, n$

$$r \subseteq r_1 * r_2 * \dots * r_n$$

Επιθυμητές Ιδιότητες Διάσπασης

1. Διασπάσεις χωρίς απώλειες στη συνένωση
2. Διατήρηση των συναρτησιακών εξαρτήσεων

Διάσπαση Άνευ Απωλειών στη Συνένωση

Έστω C το σύνολο περιορισμών στην R . Μια διάσπαση του R σε $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ είναι μια **διάσπαση άνευ απωλειών στη συνένωση (lossless join decomposition)** αν για όλες τις σχέσεις $r(R)$ που είναι νόμιμες στο C ισχύει

$$r = \pi_{R_1}(r) * \pi_{R_2}(r) * \dots * \pi_{R_n}(r)$$

Ονομάζεται και **μη προσθετική συνένωση (non-additive join)**

Παράδειγμα

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| r | <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table> | A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | r₁ | <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table> | A | B | 1 | 2 | 4 | 2 | r₁ * r₂ | <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table> | A | B | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | $R_1 \cap R_2 = B$ |
| A | B | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | r₂ | <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td></tr> </table> | B | C | 2 | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

✓ Δεν μπορούμε να πάρουμε την αρχική σχέση r από τα r_1 και r_2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| r₁ | <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>C</td></tr> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td></tr> </table> | A | C | 1 | 3 | 4 | 5 | r₂ | <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td></tr> </table> | B | C | 2 | 3 | 2 | 5 | $R_1 \cap R_2 = C$ |
| A | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Διάσπαση Άνευ Απωλειών στη Συνένωση

Θεώρημα

Έστω R ένα σχεσιακό σχήμα και F ένα σύνολο από συναρτησιακές εξαρτήσεις στο R . Έστω R_1 και R_2 μια διάσπαση του R . Αν μια τουλάχιστον από τις ΣΕ

$$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \text{ ή } R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \text{ ανήκει στο } F^+$$

τότε η διάσπαση είναι χωρίς απώλειες στη συνένωση.

Δηλαδή τα κοινά γνωρίσματα των δύο σχημάτων είναι κλειδί για τουλάχιστον ένα από τα δύο σχήματα

Παράδειγμα

Παράδειγμα: $R = \{\text{Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος, Όνομα-Ηθοποιού, Διεύθυνση, Έτος-Γέννησης}\}$

Τίτλος Έτος \rightarrow Διάρκεια

Τίτλος Έτος \rightarrow Είδος

Όνομα Ηθοποιού \rightarrow Διεύθυνση

Όνομα-Ηθοποιού \rightarrow Έτος Γέννησης

$R_1 = \{\text{Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος}\}$

$R_2 = \{\text{Τίτλος, Έτος, Όνομα-Ηθοποιού, Διεύθυνση, Έτος-Γέννησης}\}$

$R_1 \cap R_2 = \{\text{Τίτλος, Έτος}\}$

Διατήρηση Εξαρτήσεων

Στόχος

Για να ελέγξουμε ότι διατηρούνται οι Σ.Ε. στο αρχικό σχήμα, όταν γίνονται τροποποιήσεις σε μία από τις σχέσεις $r_i(R_i)$, να αρκεί να ελέγξουμε μόνο τη συγκεκριμένη σχέση (δηλαδή, να μη χρειάζεται να υπολογίσουμε την αρχική σχέση - αποφυγή των συνενώσεων)

Έστω F ένα σύνολο από ΣΕ στο σχήμα R και $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ μια διάσπαση του R .

F_i περιορισμός (ή προβολή) του F στο R_i είναι το σύνολο όλων των συναρτησιακών εξαρτήσεων του F^+ που περιέχουν μόνο γνωρίσματα του R_i .

Προσοχή: F^+ όχι F

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Έστω $R(A, B, C, D)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$. Περιορισμός του F στο $S(A, C)$ (δηλαδή ποιες ΣΕ του F^+ ισχύουν στο S)

Παράδειγμα 2: Έστω $R(A, B, C, D, E)$, $F = \{A \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow B\}$. Περιορισμός του F στο $S(A, B, C)$

Διατήρηση Εξαρτήσεων

Έστω F ένα σύνολο από ΣΕ στο σχήμα R και $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ μια αποσύνθεση του R και F_i η προβολή (περιορισμός της F στο R_i).

$$\text{Έστω } F' = F_1 \cup F_2 \dots \cup F_n$$

Μια διάσπαση είναι μια **διάσπαση που διατηρεί τις εξαρτήσεις** (dependency preserving) αν $F'^+ = F^+$

Παραδείγματα

Έστω $R(A, B, C, D)$, $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C, BD \rightarrow A\}$ και η διάσπαση του R σε $R_1(A, C)$ και $R_2(A, B, D)$.

(α) Διατηρεί τις εξαρτήσεις;

(β) Είναι χωρίς απώλειες (lossless join);

Έστω $R(A, B, C, D, E)$, $F = \{A \rightarrow D, B \rightarrow E, DE \rightarrow C, B \rightarrow C\}$.

(α) Η διάσπαση του R σε $S(A, B, C)$ και $T(A, B, D, E)$ διατηρεί τις εξαρτήσεις;

(β) Είναι χωρίς απώλειες (lossless join);

Επιθυμητές Ιδιότητες (ανασκόπηση)

1. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών

Η φυσική συνένωση των σχέσεων που προκύπτουν μας δίνει ακριβώς την αρχική σχέση (χωρίς επιπρόσθετες πλειάδες): $r = \pi_{R_1}(r) * \pi_{R_2}(r) * \dots * \pi_{R_n}(r)$

$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$ ή $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$ ανήκει στο F^+ , δηλαδή τα κοινά γνωρίσματα των δύο σχημάτων είναι κλειδί για τουλάχιστον ένα από τα δύο

2. Διατήρηση Εξαρτήσεων

Στόχος: Έλεγχος διατήρησης εξαρτήσεων όταν γίνονται τροποποιήσεις χωρίς να υπολογίζουμε τις αρχικές σχέσεις (αποφυγή των συνενώσεων)

$F' = F_1 \cup F_2 \dots \cup F_n$, πρέπει $F'^+ = F^+$

3. Αποφυγή Επανάληψης Πληροφορίας

πως; Κανονικές Μορφές

Ερωτήσεις;

Κανονικοποίηση Σχήματος

Σχεδιασμός

Διάσπαση καθολικού σχήματος

Επιθυμητές ιδιότητες

1. όχι απώλειες στη συνένωση
2. διατήρηση εξαρτήσεων
3. όχι επανάληψη πληροφορίας λόγω ΣΕ



Κανονικές μορφές

Κανονικές Μορφές

Στόχος: Δοθέντος ενός σχήματος, αν είναι «καλό» ή χρειάζεται περαιτέρω διάσπαση.

Πως; Κανονικές μορφές.

- Ξέρουμε ότι αν ένα σχήμα είναι σε κάποια Κανονική Μορφή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα

- Με φθίνουσα σειρά (από την πιο περιοριστική στη λιγότερο περιοριστική)

BCNF 3NF 2NF 1NF

- Οι ορισμοί των κανονικών μορφών βασίζονται σε Σ.Ε., οι Σ.Ε. έχουν σχέση με την επανάληψη πληροφορίας

Κανονικές Μορφές

Πλεονασμός (επανάληψη πληροφορίας)

Ταινία

| | | | | |
|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|
| <u>Τίτλος</u> | <u>Έτος</u> | Διάρκεια | Είδος | <u>Όνομα-Ηθοποιού</u> |
|---------------|-------------|----------|-------|-----------------------|

Τι συμβαίνει με το (πρωτεύον) κλειδί και τις συναρτησιακές εξαρτήσεις;

BCNF

Ένα σχεσιακό σχήμα R είναι σε **Κανονική Μορφή Boyce-Codd (BCNF)** σε σχέση με ένα σύνολο F συναρτησιακών εξαρτήσεων αν

για όλες τις ΣΕ στο F^+ της μορφής $X \rightarrow Y$ ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

-- $X \rightarrow Y$ είναι μια τετριμμένη ΣΕ ή

-- X είναι **υπερκλειδί (δηλαδή υποψήφιο κλειδί ή υπερσύνολο υποψήφιου κλειδιού)** του σχήματος R

Δηλαδή το αριστερό μέρος κάθε μη τετριμμένης ΣΕ πρέπει να περιέχει ένα κλειδί

Το σχήμα μιας ΒΔ είναι σε BCNF αν το σχήμα κάθε σχέσης της είναι σε BCNF.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Ταινία (Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος, Όνομα-Ηθοποιού)

Η σχέση Ταινία δεν είναι σε BCNF

(υποψήφιο) κλειδί: {Τίτλος, Έτος, Όνομα-Ηθοποιού}

Για παράδειγμα η ΣΕ Τίτλος Έτος → Διάρκεια

Παράδειγμα 2

Οποιαδήποτε σχέση με δύο γνωρίσματα είναι σε BCNF

Αλγόριθμος Διάσπασης σε BCNF

- Βρες μια μη τετριμμένη ΣΕ που παραβιάζει τον BCNF ορισμό, έστω $X \rightarrow Y$ και $X \cap Y = \emptyset$
- Διάσπαση του αρχικού σχήματος R σε δύο σχήματα

R_1 με γνωρίσματα $X \cup Y$

R_2 με γνωρίσματα $R - Y$

Ευριστικός: στα δεξιά όσο το δυνατόν περισσότερα γνωρίσματα

Διάσπαση χωρίς απώλειες;

Παράδειγμα

Ταινία (Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος, Όνομα-Ηθοποιού)

Τίτλος Έτος → Διάρκεια Είδος

Ταινία1(Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος)

Ταινία2(Τίτλος, Έτος, Όνομα-Ηθοποιού)

BCNF

Μπορεί να χρειαστεί παραπάνω από μία διάσπαση

Διάσπαση του αρχικού σχήματος R σε δύο σχήματα

- R_1 με γνωρίσματα $X \cup Y$ και

- R_2 με γνωρίσματα $R - Y$

Συνεχείς διασπάσεις,

αφού καταλήγουμε σε σχέσεις με αυστηρά μικρότερο αριθμό γνωρισμάτων, η διαδικασία τερματίζει

BCNF

Παραβίαση του BCNF σημαίνει ότι υπάρχει $X \rightarrow A$ όπου το X δεν είναι υπερκλειδί

Περίπτωση 1: X είναι γνήσιο υποσύνολο κάποιου υποψήφιου κλειδιού
(μερική εξάρτηση)

Παραδείγματα Μερικής Εξάρτησης

Παράδειγμα: Θεωρούμε ότι ένας λογαριασμός μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από έναν πελάτη και ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλούς λογαριασμούς.

Λογαριασμός

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|---------------------|
| Όνομα-Υποκαταστήματος | <u>Αριθμός-Λογαριασμού</u> | Ποσό | <u>Όνομα-Πελάτη</u> |
|-----------------------|----------------------------|------|---------------------|

Παράδειγμα: Ένας Πελάτης πολλά δάνεια και ένα Δάνειο από παραπάνω από έναν πελάτη

Πελάτης

| | | | |
|---------------------|------|------|------------------------|
| <u>Όνομα-Πελάτη</u> | Οδός | Πόλη | <u>Αριθμός-Δανείου</u> |
|---------------------|------|------|------------------------|



Διεύθυνση πελάτη

BCNF

Παραβίαση του BCNF σημαίνει ότι υπάρχει $X \rightarrow A$ όπου το X δεν είναι υπερκλειδί

Περίπτωση 2: X δεν είναι γνήσιο υποσύνολο κάποιου υποψήφιου κλειδιού

Τότε έστω K (υποψήφιο κλειδί)

$K \rightarrow X \rightarrow A$ (μεταβατική εξάρτηση)

- Δε μπορώ να συνδυάσω μια τιμή του X με μια τιμή του K χωρίς να συνδυάσω μια τιμή A με μια τιμή X
- Δε μπορώ να εισάγω τιμή του X , χωρίς να ξέρω και το «σωστό» A

Παράδειγμα Μεταβατικής Εξάρτησης

Ταινία-Εταιρεία (Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος, Εταιρεία-Παραγωγής, Διεύθυνση-Εταιρείας)

Πρόβλημα: υπάρχει μια *μεταβατική* εξάρτηση

Τίτλος Έτος → Εταιρεία-Παραγωγής

Εταιρεία-Παραγωγής → Διεύθυνση-Εταιρείας

Τίτλος Έτος → Διεύθυνση-Εταιρείας

Για να αντιστοιχήσουμε μια ταινία σε εταιρεία πρέπει να ξέρουμε τη διεύθυνση!

Ταινία-Εταιρεία1 (Εταιρεία-Παραγωγής, Διεύθυνση-Εταιρείας)

Ταινία-Εταιρεία2 (Τίτλος, Έτος, Διάρκεια, Είδος, Εταιρεία-Παραγωγής)

BCNF Διάσπαση και Διατήρηση Εξαρτήσεων

Δεν είναι πάντα δυνατή η αποσύνθεση σε μια BCNF που να διατηρεί τις εξαρτήσεις

Παράδειγμα

Έστω η σχέση Παίζει(Έργο, Κινηματογράφος, Πόλη) με τους περιορισμούς:

Κινηματογράφος → Πόλη

Έργο Πόλη → Κινηματογράφος

Υποψήφια Κλειδιά;

{Έργο, Πόλη} {Κινηματογράφος, Έργο}

BCNF Διάσπαση και Διατήρηση Εξαρτήσεων

Παίζει(Έργο, Κινηματογράφος, Πόλη) $F = \{ \text{Κινηματογράφος} \rightarrow \text{Πόλη}, \text{Έργο} \text{ Πόλη} \rightarrow \text{Κινηματογράφος} \}$

Υποψήφια Κλειδιά {Έργο, Πόλη} {Κινηματογράφος, Έργο}

Αποσύνθεση σε: $R_1\{\text{Κινηματογράφος}, \text{Πόλη}\}$ και $R_2\{\text{Κινηματογράφος}, \text{Έργο}\}$

Διατηρεί τις εξαρτήσεις;

| Κινηματογράφος | Πόλη | Κινηματογράφος | Έργο |
|------------------------|-------|------------------------|---------|
| Odeon-ABANA | Αθήνα | Odeon-ABANA | Gravity |
| Village Center Μαρούσι | Αθήνα | Village Center Μαρούσι | Gravity |

Δε μπορώ κοιτάζοντας μόνο την R_2 (ή την R_1) να δω ότι η εισαγωγή της δεύτερης πλειάδας παραβιάζει μια ΣΕ (πρέπει να κάνω συνένωση!)

3NF

Ένα σχεσιακό σχήμα R είναι σε **τρίτη κανονική μορφή (3NF)** σε σχέση με ένα σύνολο F συναρτησιακών εξαρτήσεων αν για όλες τις ΣΕ στο F^+ της μορφής $X \rightarrow Y$ ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

- $X \rightarrow Y$ είναι μια τετριμμένη ΣΕ ή
- X είναι υπερκλειδί του σχήματος R
- κάθε γνώρισμα A του $Y - X$ περιέχεται σε κάποιο υποψήφιο κλειδί

Πρωτεύον γνώρισμα (prime attribute): Γνώρισμα που ανήκει σε κάποιο υποψήφιο κλειδί

Δηλαδή, επιτρέπει συναρτησιακές εξαρτήσεις που στο δ.μ. έχουν πρωτεύοντα γνωρίσματα

BCNF πιο περιοριστική -- αν σε BCNF \Rightarrow 3NF

Παράδειγμα

Παίζει(Έργο, Κινηματογράφος, Πόλη)

$F = \{\text{Κινηματογράφος} \rightarrow \text{Πόλη}, \text{Έργο Πόλη} \rightarrow \text{Κινηματογράφος}\}$

Υποψήφια Κλειδιά {Έργο, Πόλη} {Κινηματογράφος, Έργο}

Υπάρχει μια μεταβατική εξάρτηση

Αλλά απαιτούμε να είναι σε πρωτεύον γνώρισμα

Η σχέση είναι σε 3NF

Διάσπαση σε 3NF

Αλγόριθμος (Από) σύνθεσης σε 3NF

1. Υπολόγισε το ελάχιστο κάλυμμα F_c του F της αρχικής R
2. Για κάθε α.μ. X μιας συναρτησιακής εξάρτησης του F_c
έστω Y το σύνολο όλων των γνωρισμάτων A_i που εμφανίζονται στο δ.μ. μιας ΣΕ του F_c $X \rightarrow A_i$
νέα σχέση με γνωρίσματα $X \cup Y$
(δηλαδή, το X και όλα τα γνωρίσματα που εξαρτώνται από το X)
3. Αν κανένα από τα σχήματα που δημιουργούνται δεν περιέχει κλειδί της R , δημιούργησε ένα σχήμα σχέσης που να περιέχει τα γνωρίσματα που σχηματίζουν κλειδί (όχι απώλεια)

3NF

Αλγόριθμος Αποσύνθεσης σε 3NF

- Απώλειες στη συνένωση;
- Διατήρηση εξαρτήσεων;

Κανονικές Μορφές (επανάληψη)

Κανονική Μορφή Boyce-Codd

Ένα σχεσιακό σχήμα R είναι σε BCNF σε σχέση με ένα σύνολο F συναρτησιακών εξαρτήσεων αν για όλες τις ΣΕ στο F^+ της μορφής $X \rightarrow Y$ ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

- $X \rightarrow Y$ είναι μια τετριμμένη ΣΕ ή
- X είναι υπερκλειδί του σχήματος R

Τρίτη Κανονική Μορφή

-- κάθε γνώρισμα A του $Y - X$ περιέχεται σε κάποιο υποψήφιο κλειδί (είναι πρωτεύον γνώρισμα)

Κανονικές Μορφές (επανάληψη)

| | BCNF | 3NF |
|--|-----------|-----------|
| • Αποφυγή επανάληψης πληροφορίας | ναι | όχι πάντα |
| • Αποσύνθεση χωρίς απώλειες στη συνένωση | ναι | ναι |
| • Διατήρηση εξαρτήσεων | όχι πάντα | ναι |

Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων

- Η διαδικασία Κανονικοποίησης έχει και μειονεκτήματα:
 - ο Δεν είναι δημιουργική
 - ο Συνήθως η κανονικοποίηση γίνεται αφού έχουμε κάποιο σχήμα (μας λέει αν είναι «καλό» ή «κακό»)
 - ο Δεν προσφέρει ένα εννοιολογικό σχήμα (ασχολείται μόνο με σχέσεις και γνωρίσματα)

Όμως, είναι μια ενδιαφέρουσα και πρακτικά χρήσιμη προσπάθεια να γίνουν με τυπικό και συστηματικό τρόπο πράγματα που τα κάνουμε συνήθως διαισθητικά.

Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων

- Υπάρχουν **εμπορικά εργαλεία**, που με είσοδο ένα σύνολο Σχημάτων Σχέσεων/Γνωρισμάτων και ένα σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων **δημιουργούν αυτόματα** σχήματα σχέσεων σε μορφή 3NF (σπάνια πάνε σε BCNF, 4NF και 5NF)
- Μια άλλη χρήση τέτοιων εργαλείων είναι να **ελέγχουν το επίπεδο κανονικοποίησης** μιας σχέσης - γενικά, η χρήση ως ευριστικό εργαλείο επιλογής ενός σχεδιασμού έναντι κάποιου άλλου
- Υπάρχουν **πρακτικά αποτελέσματα** της θεωρίας που επιτρέπουν σε έναν σχεδιαστή να κάνει ανάλυση της μορφής:
 - Διάφορα θεωρητικά αποτελέσματα, πχ: Αν μια σχέση είναι σε 3NF και κάθε υποψήφιο κλειδί αποτελείται ακριβώς από ένα γνώρισμα, τότε είναι και σε 5NF (Fagin, 1991)

Πλειότιμες Εξαρτήσεις

Υπάρχει επανάληψη πληροφορίας που δεν μπορεί να εκφραστεί με απλές ΣΕ

Πλειότιμες Εξαρτήσεις

- Προκύπτουν όταν δυο γνωρίσματα είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο

Παράδειγμα

Ηθοποιός(Όνομα, Οδός, Πόλη, Τίτλος, Έτος)

Ας υποθέσουμε ότι για κάθε ηθοποιό είναι πιθανόν να υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, και ένα ηθοποιός παίζει σε πολλές ταινίες

Κανένα από τα 5 γνωρίσματα δεν εξαρτάται συναρτησιακά από τα άλλα τέσσερα \Rightarrow δεν υπάρχουν μη μη τετριμμένες εξαρτήσεις \Rightarrow κλειδί ?

π.χ., Όνομα Οδός Τίτλος Έτος \rightarrow Πόλη δεν ισχύει

Πλειότιμες Εξαρτήσεις

Παράδειγμα (συνέχεια)

Ηθοποιός(Όνομα, Οδός, Πόλη, Τίτλος, Έτος)

Όλες οι εξαρτήσεις είναι τετριμμένες

Το σχήμα είναι σε BCNF αλλά υπάρχει επανάληψη πληροφορίας που δεν οφείλεται όμως σε συναρτησιακές εξαρτήσεις

Παράδειγμα

Ηθοποιός(Όνομα, Οδός, Πόλη, Τίτλος, Έτος)

Όνομα →→ Οδός Πόλη

Ο ηθοποιός C. Fisher έχει 2 διευθύνσεις:

| Όνομα | Οδός | Πόλη | Τίτλος | Έτος |
|-----------|----------------|-----------|---------------------|------|
| C. Fisher | 123 Mapple Str | Hollywood | Star Wars | 1977 |
| C. Fisher | 5 Locust Ln | Malibu | Empire Strikes Back | 1980 |
| ? | | | | |
| ? | | | | |

Πλειότιμες Εξαρτήσεις

$$X \twoheadrightarrow Y$$

Για κάθε ζεύγος πλειάδων t_1 και t_2 της σχέσης R που συμφωνούν σε όλα τα γνωρίσματα του X μπορούμε να βρούμε στο R δυο πλειάδες t_3 και t_4 τέτοιες ώστε

- και οι δυο συμφωνούν με τις t_1 και t_2 στο X :

$$t_1[X] = t_2[X] = t_3[X] = t_4[X]$$

- η t_3 συμφωνεί με την t_1 στο Y : $t_3[Y] = t_1[Y]$
- η t_3 συμφωνεί με την t_2 στο $R - X - Y$: $t_3[R - X - Y] = t_2[R - X - Y]$
- η t_4 συμφωνεί με την t_2 στο Y : $t_4[Y] = t_2[Y]$
- η t_4 συμφωνεί με την t_1 στο $R - X - Y$: $t_4[R - X - Y] = t_1[R - X - Y]$

Πλειότιμες Εξαρτήσεις

$$A_1 A_2 \dots A_n \quad \longrightarrow \quad B_1 B_2 \dots B_m$$

Όνομα


Πόλη Οδός

Τίτλος Έτος

X

Y

R - X - Y



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|---|-------|
| A_1 | A_2 | ... | A_n | B_1 | B_2 | ... | B_m | C_1 | C_2 | ... | C_k | ← | t_1 |
| a_1 | a_2 | ... | a_n | b_1 | b_2 | ... | b_m | c_1 | c_2 | ... | c_k | ← | t_2 |
| a_1 | a_2 | ... | a_n | b'_1 | b'_2 | ... | b'_m | c'_1 | c'_2 | ... | c'_k | ← | t_3 |
| | | | | | | | | | | | | ← | t_4 |

Άσκηση 1 (Ιουν 13)

Έστω το σχεσιακό σχήμα $R(A, B, C, D)$ στο οποίο ισχύει μόνο η συναρτησιακή εξάρτηση $A \rightarrow B$.

(i) Δώστε το υποψήφια (υποψήφιο) κλειδιά.

(ii) Είναι σε BCNF ή όχι και γιατί. Αν όχι διασπάστε τη σχέση σε σχέσεις που να είναι σε BCNF (χρησιμοποιώντας το σχετικό αλγόριθμο) και δώστε τα το υποψήφια (υποψήφιο) κλειδιά για κάθε μια από τις σχέσεις που προκύπτουν.

Έστω μια σχεσιακή βάση με σχήμα $S(E, F, G)$ και το στιγμιότυπο με 2 πλειάδες: $\{(123, \text{smith}, \text{main-street}), (123, \text{johnson}, \text{forbes})\}$. Για κάθε μία από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις (i)-(iii) παρακάτω εξηγήστε αν μπορείτε ή όχι να πείτε αν ισχύουν ή όχι.

(i) $E \rightarrow F$

(ii) $EF \rightarrow G$

(iii) $F \rightarrow G$

Άσκηση 2 (Σεπ 13)

Έστω ότι στο σχεσιακό σχήμα $R = (P, Q, S, T, U, V)$ ισχύει το σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων $F = \{Q \rightarrow ST, P \rightarrow T, PS \rightarrow T, QU \rightarrow V\}$.

- (α) Υπάρχει κάποια εξάρτηση που είναι περιττή. Εξηγείστε.
- (β) Ισχύει ή όχι $Q \rightarrow S$. Εξηγείστε.
- (γ) Είναι το $\{Q, P\}$ κλειδί ή όχι; Εξηγείστε.
- (δ) Είναι το $\{Q, P, V, U\}$ υποψήφιο κλειδί ή όχι; Εξηγείστε.

Ερωτήσεις;