

Σχεσιακή Άλγεβρα

Τι έχουμε δει έως σήμερα

- Σχεδιασμό βάσεων δεδομένων (ορισμός σχήματος)
 - μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων
 - σχεσιακό μοντέλο

Μια γλώσσα ορισμού δεδομένων ΓΟΔ (για τον ορισμό των σχημάτων)

ένας μεταφραστής της ΓΟΔ επεξεργάζεται τις εντολές της ΓΟΔ, αναγνωρίζει τις περιγραφές των δομικών στοιχείων του σχήματος και αποθηκεύει την περιγραφή του σχήματος στον κατάλογο του ΣΔΒΔ

Μια γλώσσα χειρισμού δεδομένων ΓΧΔ (αφορά τα στιγμιότυπα)

- Γλώσσα ενημέρωσης
- Γλώσσες ερωτήσεων (το αντικείμενο των επόμενων διαλέξεων)

Γλώσσες Ερωτήσεων (query languages)

Επιτρέπουν την εύρεση πληροφορίας από μια βάση δεδομένων μέσω της διατύπωσης *ερωτημάτων (queries)* στον τρέχων στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων

Γλώσσες Ερωτήσεων

Δύο μαθηματικές γλώσσες ερωτήσεων αποτελούν τη βάση για τις εμπορικές γλώσσες ερωτήσεων (π.χ., SQL) και για την υλοποίησή τους

- **Σχεσιακή Άλγεβρα (relational algebra)**: Λειτουργική “operational” (database byte-code!): αποτελείται από ένα σύνολο τελεστών και περιγράφει τα βήματα για τον υπολογισμό του αποτελέσματος
- **Σχεσιακός Λογισμός (relational calculus)**: Επιτρέπει στους χρήστες να περιγράψουν τι θέλουν αλλά όχι πώς να το υπολογίσουν

Αυτές οι τυπικές γλώσσες επηρέασαν τις εμπορικές γλώσσες (SQL, QBE) που θα δούμε στα επόμενα μαθήματα

Γλώσσες Ερωτήσεων

Γλώσσες Ερωτήσεων != Γλώσσες Προγραμματισμού!

- Δεν αναμένεται να είναι “Turing complete”.
- Δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για “περίπλοκους υπολογισμούς”.
- Υποστηρίζουν **εύκολη** και **αποδοτική** προσπέλαση σε **μεγάλα σύνολα δεδομένων**.

Σχεσιακή Άλγεβρα

Σχεσιακή άλγεβρα: έναν απλό τρόπο δημιουργίας νέων σχέσεων από υπάρχουσες.

Ένα σύνολο από πράξεις που όταν εφαρμοστούν σε σχέσεις (πίνακες, σύνολο πλειάδων) μας δίνουν νέες σχέσεις

Σχεσιακή Άλγεβρα

Μια ερώτηση εφαρμόζεται σε ένα στιγμιότυπο σχέσης και το αποτέλεσμα της ερώτησης είναι πάλι ένα στιγμιότυπο σχέσης (σύνολο από πλειάδες)

- Το σχήμα της σχέσης εισόδου είναι προκαθορισμένο
- Το σχήμα του αποτελέσματος είναι επίσης προκαθορισμένο

Σχεσιακή Άλγεβρα

Οι πράξεις τις σχεσιακής άλγεβρας:

1. Πράξεις που αφαιρούν «κομμάτια» από μια σχέση είτε *επιλέγοντας γραμμές* (σ) είτε *προβάλλοντας στήλες* (π)
2. Οι συνηθισμένες πράξεις συνόλου: ένωση, τομή, διαφορά
3. Πράξεις που συνδυάζουν πλειάδες από δύο σχέσεις
4. Μετονομασία γνωρισμάτων

Επιλογή (σ)

Η πράξη της επιλογής (select)

Επιλογή ενός υποσυνόλου των πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής

$$\sigma_{<\text{συνθήκη επιλογής}>} (<\text{όνομα σχέσης}>)$$

Το σχήμα εξόδου είναι το ίδιο με το σχήμα εισόδου

Επιλογή (σ)

Επιλογή ενός υποσυνόλου των πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής

$\sigma_{<\text{συνθήκη επιλογής}>} (<\text{όνομα σχέσης}>)$

<συνθήκη επιλογής>


προτάσεις της μορφής

<όνομα γνωρίσματος>

<τελεστής σύγκρισης>


<όνομα γνωρίσματος> ή <σταθερή τιμή από το πεδίο ορισμού του γνωρίσματος>

συνδυασμένες με AND, OR, NOT



=, >, <, ≠, ≥ , ≤

Επιλογή (σ)



Επιλογή (σ)

Παραδείγματα

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη
Wayne's World	1992	95	έγχρωμη

1. Ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 100 λεπτών)

$\sigma_{\Delta\text{ιάρκεια}} > 100$ (Ταινία)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη

Επιλογή (σ)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη
Wayne's World	1992	95	έγχρωμη

2. Ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 100 λεπτών που γυρίστηκαν μετά το 1995

$\sigma_{\Delta\text{ιάρκεια} > 100 \text{ AND } \text{Έτος} > 1995}$ (Ταινία)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη

Επιλογή (σ)

- Η συνθήκη επιλογής εφαρμόζεται ανεξάρτητα σε κάθε πλειάδα
- Ο τελεστής είναι **μοναδιαίος**
- Ο **βαθμός** της σχέσης που προκύπτει είναι ίδιος με τον βαθμό της αρχικής σχέσης
- **Πλήθος πλειάδων** μικρότερο ή ίσο με την αρχική σχέση: ποσοστό που επιλέγονται - *επιλεκτικότητα (selectivity)*

Επιλογή (σ)

$$\sigma_B = \exists \left(\sigma_A >_2 (R) \right)$$

$$\sigma_B = \exists \underbrace{A \text{ AND } A >_2}_{(R)}$$

Ιδιότητες

Αντιμεταθετική

$$\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>} (\sigma_{<\sigma_{uv\theta 2}>} (R)) = \sigma_{<\sigma_{uv\theta 2}>} (\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>} (R))$$

- $\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>} (\sigma_{<\sigma_{uv\theta 2}>} (\dots \sigma_{<\sigma_{uv\theta n}>} (R) \dots)) =$

$$\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>} \text{ AND } <\sigma_{uv\theta 2}> \dots \text{ AND } <\sigma_{uv\theta n}> (R)$$

$\delta_{A>B}(R)$

R	A	B	C
	2	1	5
	8	3	4
	6	2	1
	4	5	2
	6	0	1
	7	5	9
	8	2	1

$\sigma_{A > 2 \text{ AND } B < 3}(R)$	R	A	B	C
	2	1	5	
	8	3	4	
	6	2	1	
	4	5	2	
	3	0	1	
	6	5	9	
	7	2	1	

Το αποτέλεσμα είναι

- A. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 3 γραμμές
- B. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 2 γραμμές
- C. Ένας πίνακας με 2 στήλες και 3 γραμμές
- D. Ένας πίνακας με 2 στήλες και 2 γραμμές

Προβολή (π)

Η πράξη της προβολής (project)

Επιλογή συγκεκριμένων στηλών (γνωρισμάτων)

$\pi_{<\lambda\text{ίστα γνωρισμάτων}>}(<\!\!\text{όνομα σχέσης}\!>)$

Το σχήμα εξόδου καθορίζεται από τη λίστα γνωρισμάτων

Προβολή (π)

Παραδείγματα

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη
Wayne's World	1992	95	έγχρωμη

Προβολή (π)

1. Τίτλος, χρόνος, διάρκεια των ταινιών

Π Τίτλος, Έτος, Διάρκεια (Ταινία)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια
Star Wars	1997	124
Mighty Ducks	1991	104
Wayne's World	1992	95

Προβολή (π)

2. Είδος ταινιών

$\pi_{\text{Είδος}}$ (Ταινία)

Είδος

έγχρωμη

Προσοχή: απαλοιφή διπλότιμων

Γιατί;

Με βάση τον ορισμό το αποτέλεσμα είναι σχέση (δηλαδή, **σύνολο πλειάδων**)

Προβολή (π)

- Τα γνωρίσματα έχουν την ίδια διάταξη
- Ο τελεστής είναι **μοναδιαίος**
- Ο **βαθμός** της σχέσης είναι ίσος με τον αριθμό γνωρισμάτων στη <λίστα γνωρισμάτων>
- **Πλήθος πλειάδων** μικρότερο ή ίσο (πότε;) με την αρχική σχέση

Προβολή (π)

Ιδιότητες

- αντιμεταθετική;
- $\pi_{<\lambda\text{ιστα1}>}(\pi_{<\lambda\text{ιστα2}>}(R)) = ?$

Παράδειγμα

Παράδειγμα

Διάρκειες των ταινιών που είναι μεγαλύτερες των 100 λεπτών

$\pi_{\text{Διάρκεια}} (\sigma_{\text{Διάρκεια} > 100 \text{ (Ταινία)}}$

Διάρκεια

124

104

$\cap_{A,B} (R)$

R	A	B	C
	2	1	5
	8	3	4
	6	2	1
	4	5	2
	6	0	1
	7	5	9
	8	2	1

$\cap_A (6, B > 3)$

R		
A	B	C
2	1	5
8	3	4
6	2	1
4	5	2
3	0	1
6	5	9
7	2	1

$\pi_c(R)$

Το αποτέλεσμα είναι

- A. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 7 γραμμές
- B. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 5 γραμμές
- C. Ένας πίνακας με 1 στήλη και 7 γραμμές
- D. Ένας πίνακας με 1 στήλες και 5 γραμμές

Πράξεις Συνόλων

Πράξεις συνόλου

1. Ένωση (\cup)
2. Τομή (\cap)
3. Διαφορά (-)

Συμβατότητα ως προς την ένωση

Δύο σχέσεις $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ και $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ είναι συμβατές ως προς την ένωση όταν

1. Έχουν τον ίδιο βαθμό n
2. $\forall i, \text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$

Πράξεις Συνόλων

- Σύμβαση: η σχέση που προκύπτει έχει τα ίδια ονόματα γνωρισμάτων με την πρώτη σχέση
- Απαλοιφή διπλότιμων

Παραδείγματα

	A	B	
R	1	2	$\sigma_{A > B}(R)$
	1	4	
	2	1	$\Pi_A(R)$
	6	5	$R \cup S$
S	B	C	
	2	3	
	2	5	
	1	4	

R	A	B	C
1	2	3	
4	5	6	
1	8	9	
3	2	6	

S	A	B	C
4	2	9	
6	1	8	
4	2	3	

$$\pi_A(R) \cup \pi_A(S)$$

- Το αποτέλεσμα είναι
ένας πίνακας με
- A. 3 στήλες και 6 γραμμές
 - B. 3 στήλες και 4 γραμμές
 - C. 1 στήλη και 6 γραμμές
 - D. 1 στήλη και 4 γραμμές

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον

ΣΕΡΒΙΡΕΙ

ΜΑΓΑΖΙ	ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ
Roma	Vegetarian
Roma	Σπέσιαλ
Napoli	Vegetarian
Napoli	Ελληνική
Pizza-Express	Χαβάη
Pizza-Express	Σπέσιαλ
Pizza-Express	Ελληνική
Pizza-Place	Σπέσιαλ

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. *Tα συστατικά της πίτσας Σπέσιαλ*
2. *Tα συστατικά που μπορούμε να βρούμε σε πίτσες*
3. *Ποιες πίτσες (τα ονόματά τους) περιέχουν μανιτάρι*
4. *To συστατικό που αρέσει του λάχιστον σε ένα φοιτητή*

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό το μανιτάρι
2. Ποιες πίτσες (όνομα) **δεν έχουν** ως συστατικό το μανιτάρι
3. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι **ή** ζαμπόν
4. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι **και** ζαμπόν
5. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι και δεν έχουν ζαμπόν

Σχεσιακή Άλγεβρα

Οι πράξεις τις σχεσιακής άλγεβρας:

- ✓ 1. Πράξεις που αφαιρούν κομμάτια από μια σχέση είτε επιλέγοντας γραμμές είτε προβάλλοντας στήλες
- ✓ 2. Οι συνηθισμένες πράξεις συνόλου - ένωση, τομή, διαφορά
- 3. Πράξεις που συνδυάζουν πλειάδες από δύο σχέσεις
- 4. Μετονομασία γνωρισμάτων

Καρτεσιανό Γινόμενο

(ή χιαστί γινόμενο (cross product) ή χιαστί συνένωση (cross join))

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n) \times S(B_1, B_2, \dots, B_m)$$

αποτέλεσμα η σχέση Q: $Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$

- $n + m$ γνωρίσματα
- $n_R * n_S$ πλειάδες

Καρτεσιανό Γινόμενο

R

R		S		
A	B	B'	C	D
1	2	2	5	6
3	4	4	7	8

9	10	11
---	----	----

R x S

A	B	B'	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

Συνένωση (join)

(ή θήτα συνένωση) (join)

συνδυασμός σχετιζόμενων πλειάδων




($\equiv \sigma_{<\text{συνθήκη συνένωσης}>} (R \times S)$)

Συνθήκη συνένωσης

Προτάσεις της μορφής

$A_i <\text{τελεστής σύγκρισης}> B_j$

=, >, <, ≠, ≥ , ≤



όπου A_i γνώρισμα της R , B_j γνώρισμα της S , και $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_j)$

συνδυασμένες με AND

Συνένωση

U ▷◁ A < D V

U **V**

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

B'	C'	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

A	B	C	B'	C'	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	7	8	10
9	7	8	7	8	10

U ▷◁ A < D AND B ≠ B' V

Συνένωση

- το αποτέλεσμα είναι οι συνδυασμοί πλειάδων που ικανοποιούν τη συνθήκη
- η συνθήκη αποτιμάται για κάθε συνδυασμό
- αποτέλεσμα σχέση Q με $n + m$ γνωρίσματα
- πλειάδες με τιμή $null$ σε γνώρισμα συνένωσης δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα

Επανάληψη

Σχεσιακή άλγεβρα – ένα σύνολο τελεστών που εφαρμόζονται πάνω σε σχέσεις (πίνακες) και έχουν ως αποτέλεσμα σχέσεις

επιλογή (σ)

προβολή (π)

ένωση (\cup)

διαφορά (-)

καρτεσιανό γινόμενο (x)

συνένωση \bowtie

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. *Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν κάποιο συστατικό που αρέσει στο φοιτητή Δημήτρη*

Τις πίτσες που έχουν συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian μανιτάρι

Vegetarian ελιά

Χαβάη ανανάς

Χαβάη ζαμπόν

Σπέσιαλ ζαμπόν

Σπέσιαλ μπέικον

Σπέσιαλ μανιτάρι

Ελληνική ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Δημήτρης

Κώστας

Μαρία

Κατερίνα

Μαρία

Δημήτρης

Μαρία

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ

μανιτάρι

ζαμπόν

ελιά

μανιτάρι

ζαμπόν

μπέικον

ανανάς

ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian **μανιτάρι**

Vegetarian μανιτάρι

Vegetarian ελιά

Vegetarian ελιά

Χαβάη ανανάς

Χαβάη ανανάς

Χαβάη ζαμπόν

Χαβάη ζαμπόν

Σπέσιαλ ζαμπόν

Σπέσιαλ ζαμπόν

Σπέσιαλ μπέικον

Σπέσιαλ **μπέικον**

Σπέσιαλ **μανιτάρι**

Σπέσιαλ μανιτάρι

Ελληνική ελιά

Ελληνική ελιά

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μπέικον

Συνένωση Ισότητας (equijoin)

όταν χρησιμοποιείται μόνο τελεστής ισότητας

Συνθήκη συνένωσης

Προτάσεις της μορφής

$$A_i = B_j$$

όπου A_i γνώρισμα της R , B_j γνώρισμα της S , και $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_j)$
συνδυασμένες με AND

Συνένωση Ισότητας

R

A	B
1	2
3	4

S

B'	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

A	B	B'	C	D
1	2	2	5	6
3	4	4	7	8

$$\mathbf{R} \triangleright\triangleleft \mathbf{S}$$

$\mathbf{B} = \mathbf{B}'$

Φυσική Συνένωση (natural join)

Ίδιες τιμές στα γνωρίσματα με το ίδιο όνομα

Τα κοινά γνώρισμα εμφανίζονται μόνο μια φορά στο αποτέλεσμα

$R * S$

επιλεκτικότητα συνένωσης: μέγεθος αποτελέσματος / ($n_r * n_s$)

τα κοινά γνωρίσματα εμφανίζονται μόνο μια φορά

Φυσική Συνένωση

R	A	B
1	2	
3	4	

S	B	C	D
2	5	6	
4	7	8	
9	10	11	

R * S

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

Φυσική Συνένωση

U * V

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

V

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

A	B	C	D
1	2	3	4
1	2	3	5
6	7	8	10
9	7	8	10

Σχεσιακή Άλγεβρα

Πλήρες σύνολο πράξεων

επιλογή (σ)

προβολή (π)

ένωση (\cup)

διαφορά (-)

καρτεσιανό γινόμενο (x)

Επίσης

τομή (\cap)

συνένωση \bowtie

συνένωση ισότητας

φυσική συνένωση (*)

Παραδείγματα

	A1	B1	C1		S	A2	B2	C2
R	4	2	1			3	1	2
	1	3	6			2	6	4
	2	8	3			1	3	2
	1	2	5					

1. Τις πλειάδες της R για τις οποίες το B1 είναι μικρότερο του C1
2. Τις τιμές του A1 για τις οποίες το B1 είναι μικρότερο του 5
3. Τις πλειάδες της R για τις οποίες η τιμή του A1 είναι μεγαλύτερη από τουλάχιστον μια τιμή του A2 της S
4. Τις πλειάδες της R για τις οποίες η τιμή του A1 είναι μεγαλύτερη από όλες τις τιμές του A2 της S

Μετονομασία

όνομα σε μια ενδιάμεση σχέση

R ←

Παράδειγμα

ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ← σ Διάρκεια > 100 (Ταινία)

Μετονομασία

- μετονομασία γνωρισμάτων

$R(\lambda\text{ιστα-με-νέα-ονόματα) \leftarrow$

Παράδειγμα

ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (όνομα -ταινίας, έτος-παραγωγής, διάρκεια, είδος) \leftarrow σ
διάρκεια > 100 (Ταινία)

όνομα-ταινίας	έτος-παραγωγής	διάρκεια	είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη

Μετονομασία

τελεστής μετονομασίας (*rename operator*) συμβολίζεται με ρ

για μια σχέση $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$:

η έκφραση $\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$

είναι ισοδύναμη του συμβολισμού

$S(B_1, B_2, \dots, B_n) \leftarrow R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

Ασκήσεις

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. Τα μαγαζιά που σερβίρουν τουλάχιστον μια πίτσα που έχει μανιτάρι
2. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **τουλάχιστον δύο διαφορετικά συστατικά**.
3. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **μόνο ένα συστατικό**
4. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **περισσότερα από δύο** (δηλαδή, τουλάχιστον τρία) διαφορετικά συστατικά
5. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **ακριβώς δύο** διαφορετικά συστατικά

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς

ΣΕΡΒΙΡΕΙ

ΜΑΓАЗΙ	ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ
Roma	Vegetarian
Roma	Σπέσιαλ
Napoli	Vegetarian
Napoli	Ελληνική
Pizza-Express	Χαβάη
Pizza-Express	Σπέσιαλ
Pizza-Express	Ελληνική
Pizza-Place	Σπέσιαλ

Τις πίτσες που έχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά συστατικά

ΠΙΤΣΑ					
ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ				
Vegetarian	μανιτάρι				
Vegetarian	ελιά				
Χαβάη	ανανάς				
Χαβάη	ζαμπόν				
Σπέσιαλ	ζαμπόν	O1	Σ1	O2	Σ2
Σπέσιαλ	μπέικον	Vegetarian	μανιτάρι	Vegetarian	μανιτάρι
Σπέσιαλ	μανιτάρι	Vegetarian	μανιτάρι	Vegetarian	ελιά
Ελληνική	ελιά	Vegetarian	μανιτάρι	Χαβάη	ανανάς
		Vegetarian	μανιτάρι	Χαβάη	ζαμπόν
		Vegetarian	μανιτάρι	Σπέσιαλ	ζαμπόν
		Vegetarian	μανιτάρι	Σπέσιαλ	μπέικον
		Vegetarian	μανιτάρι	Σπέσιαλ	μανιτάρι
		Vegetarian	μανιτάρι	Ελληνική	ελιά
		Vegetarian	ελιά	Vegetarian	μανιτάρι
...					
		Ελληνική	ελιά	Vegetarian	μανιτάρι
		Ελληνική	ελιά	Vegetarian	ελιά
		Ελληνική	ελιά	Χαβάη	ανανάς
		Ελληνική	ελιά	Χαβάη	ζαμπόν
		Ελληνική	ελιά	Σπέσιαλ	ζαμπόν
		Ελληνική	ελιά	Σπέσιαλ	μπέικον
		Ελληνική	ελιά	Σπέσιαλ	μανιτάρι
		Ελληνική	ελιά	Ελληνική	ελιά

Εξωτερική Συνένωση

Outer join

Όταν θέλουμε να κρατήσουμε στο αποτέλεσμα όλες τις πλειάδες - και αυτές που δεν ταιριάζουν) είτε της σχέσης στα αριστερά (αριστερή εξωτερική συνένωση) είτε της σχέσης στα δεξιά (δεξιά εξωτερική συνένωση)

$R \bowtie S$ $R \bowtie\! S$

R		S		R * S					
A	C	A	B	A	C	B	A	C	B
1	6	1	3	1	6	3	1	6	3
2	4	1	5	1	6	5	1	6	5
3	9						2	4	null

Διαίρεση

$$R(Z) \div S(X), \quad X \subseteq Z$$

Το αποτέλεσμα είναι μια καινούργια σχέση $Q(Y)$ όπου $Y = Z - X$ και
 $t \in Q(Y)$ ανν

$$\exists t_{R1} \in R, \quad t_{R1}[Y] = t \quad \text{και}$$

$$\forall t_S \in S, \exists t_R \in R, \quad t_R[X] = t_S, \quad \text{και} \quad t_R[Y] = t$$

- αναλογία με τη διαίρεση ακεραίων

διαίρεση ακεραίων: R / S το αποτέλεσμα Q τέτοιο ώστε: $Q * S \leq R$

διαίρεση σχέσεων: $R \div S$ το αποτέλεσμα Q τέτοιο ώστε ...

Με απλά λόγια, τις υπο-πλειάδες Z της R που εμφανίζονται με όλες τις τιμές της S

Διαίρεση

R	A	B	
a ₁	b ₁		S
a ₁	b ₃		
a ₁	b₄		
a ₂	b₂	<u>B</u>	
a ₂	b₄	b₂	
a ₃	b₂	b₄	Q
			<u>A</u>
	a ₂		

$$R \div S$$

$$Z = \{A, B\} \quad X = \{B\}$$

$$R(Z) \div S(X), \quad X \subseteq Z$$

Q(Y)?

$$Y = Z - X \quad Y = \{A\}$$

$$\textcolor{red}{t} \in Q, \exists t_{R1} \in R, \quad t_{R1}[Y] = \textcolor{red}{t}$$

$$\forall t_S \in S, \exists t_R \in R, \quad t_R[X] = t_S \quad \text{και} \quad t_R[Y] = \textcolor{red}{t}$$

Διαίρεση

R		
A	B	C
a ₁	b ₁	c ₁
a ₁	b ₁	c ₂
a ₂	b ₂	c ₂
a ₂	b ₁	c ₁
a ₂	b ₂	c ₁
a ₃	b ₁	c ₁
a ₃	b ₁	c ₂

R ÷ S

Παράδειγμα

S

A

a₁

a₂

a₃

Διαίρεση

R ÷ S

R			S	
A	B	C	A	B
a ₁	b ₁	c ₁	a ₁	b ₁
a ₁	b ₁	c ₂	a ₂	b ₂
a ₂	b ₂	c ₂		
a ₂	b ₂	c ₃		
a ₂	b ₂	c ₁		
a ₃	b ₁	c ₁		
a ₃	b ₁	c ₂		

Διαίρεση

$$R \div S$$

παράδειγμα: Βρες τις πίτσες που έχουν όλα τα συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη

R (ΠΙΤΣΑ)

S: Τα συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη

Q: Τα ονόματα από πίτσες που εμφανίζονται στη σχέση ΠΙΤΣΑ με όλα τα συστατικά που εμφανίζονται στο S

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΣΕΡΒΙΡΕΙ

ΜΑΓΑΖΙ	ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ	ΑΡΕΣΕΙ	ΦΟΙΤΗΤΗΣ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ
Roma	Vegetarian		Δημήτρης	μανιτάρι
Roma	Σπέσιαλ		Κώστας	ζαμπόν
Napoli	Vegetarian		Μαρία	ελιά
Napoli	Ελληνική		Κατερίνα	μανιτάρι
Pizza-Express	Χαβάη		Μαρία	ζαμπόν
Pizza-Express	Σπέσιαλ		Δημήτρης	μπέικον
Pizza-Express	Ελληνική		Μαρία	ανανάς
Pizza-Place	Σπέσιαλ			

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς

Δ_ΑΡΕΣΕΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
μανιτάρι
μπέικον

**ΟΝΟΜΑ**

Σπέσιαλ

Διαίρεση

Ισοδύναμη έκφραση για το $Q(Y) \leftarrow R(Z) \div S(X)$

- Υπολογισμός των πλειάδων που δεν πρέπει να είναι στο αποτέλεσμα.

Μια πλειάδα γ αποκλείεται από το αποτέλεσμα αν και μόνον αν: όταν της συνάψουμε μια τιμή x από το S , η πλειάδα $\langle y, x \rangle$ δεν ανήκει στο R

$$T_1 \leftarrow (\pi_Y(R) \times S) - R$$

$$Q \leftarrow \pi_Y(R) - \pi_Y(T_1)$$

Τις πίτσες που έχουν όλα τα συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian μανιτάρι

Vegetarian ελιά

Χαβάη ανανάς

Χαβάη ζαμπόν

Σπέσιαλ ζαμπόν

Σπέσιαλ μπέικον

Σπέσιαλ μανιτάρι

Ελληνική ελιά

Δ_ΑΡΕΣΕΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

μανιτάρι

μπέικον

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian

μανιτάρι

Vegetarian

μπέικον

Χαβάη

μανιτάρι

Χαβάη

μπέικον

Σπέσιαλ

μανιτάρι

Σπέσιαλ

μπέικον

Ελληνική

μανιτάρι

Ελληνική

μπέικον

$$T_1 \leftarrow (\pi_{\gamma}(R) \times S) - R$$

Άσκηση

MACHINE(mname, ipaddr, os)

EVENT(a-ipaddr, v-ipaddr, date)

MACHINE περιέχει πληροφορία για τη μηχανή (του attacker ή του θύματος) – όνομα, ip address, λειτουργικό σύστημα (os)

EVENT περιέχει πληροφορίες για την επίθεση – ip address attacker, ip address victim (θύματος), ημερομηνία)

1. Τι λίστα των θυμάτων (v-ipaddr) που δέχθηκαν επίθεση στις 2/11/2020
2. Τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει επίθεση στο θύμα '10.10.10.2'
3. Τις μηχανές (ip address) που και έχουν κάνει και έχουν δεχθεί επίθεση

Άσκηση

Τι επιστρέφει η παρακάτω ερώτηση με απλά λόγια και ποιο είναι το αποτέλεσμα της στον παρακάτω πίνακα

$$\pi_{a-ipaddr, v-ipaddr}(\text{EVENT}) \div \pi_{v-ipaddr}[\sigma_{a-ipaddr='9.9.9.9'}(\text{EVENT})]$$

EVENT	a-ipaddr	v-ipaddr	date
	9.9.9.1	10.10.10.2	2/1/2012
	9.9.9.2	10.10.10.1	2/2/2012
	9.9.9.2	10.10.10.3	2/2/2012
	9.9.9.9	10.10.10.4	2/3/2012
	9.9.9.9	10.10.10.3	2/4/2012
	9.9.9.10	10.10.10.3	2/5/2012
	9.9.9.10	10.10.10.4	2/6/2012

Αναδρομική Κλειστότητα

R

Ap_Taut	Διεύθυνση	Μισθός	Προϊστάμενος
---------	-----------	--------	--------------

Δεν είναι δυνατόν να βρούμε όλους τους υφισταμένους που επιτηρεί σε οποιοδήποτε επίπεδο ένας συγκεκριμένος προϊστάμενος (π.χ., Ap_Taut = M20200)

$$\Pi_1(\text{Προϊστ}1) \leftarrow \pi_{\text{Ap_Taut}} (\sigma_{\text{Προϊστάμενος} = \text{M20200}}(R))$$

$$\Pi_2(\text{Προϊστ}2) \leftarrow \pi_{\text{Ap_Taut}} (\Pi_1 \triangleright \triangleleft \text{Προϊστ}1 = \text{Προϊστάμενος}(R))$$

Παρόμοια, μπορώ να βρω πχ τους συμπρωταγωνιστές του George Clooney (ηθοποιούς που έπαιξαν σε τουλάχιστον μια ταινία μαζί του), τους συμπρωταγωνιστές των συμπρωταγωνιστών του κλπ άλλα μέχρι ένα βάθος

Άσκηση

athlete_id	country	name	age
A1	U.S.A.	Michael Phelps	31
A2	U.S.A.	Justin Gatlin	34
A3	U.S.A.	Ryan Lochte	32
A4	Canada	Andre De Grasse	21
A5	Jamaica	Usain Bolt	30
A6	France	Christophe Lemaitre	26
A7	Japan	Masato Sakai	24
A8	Japan	Naito Ehara	60
A9	GBR	Duncan Scott	35
A10	GBR	James Guy	32

(a) Athletes Table

event_id	name
E1	100m Sprint
E2	200m Sprint
E3	200m Butterfly
E4	4x200 Freestyle Relay

(b) Events Table

event_id	athlete_id	result
E1	A5	Gold
E1	A2	Silver
E1	A4	Bronze
E2	A5	Gold
E2	A4	Silver
E3	A1	Gold
E3	A7	Silver
E3	A9	Bronze
E4	A1	Gold
E4	A3	Gold
E4	A7	Silver
E4	A8	Silver
E4	A9	Bronze
E4	A10	Bronze

(c) Event_Results Table: the outcome of every event

1. Έστω η παρακάτω ερώτηση

$\sigma_{age < 25}(\text{Athletes} \bowtie \text{Event_Results})$

- (α) Τι υπολογίζει με απλά λόγια (το \bowtie συμβολίζει φυσική συνένωση)
(β) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της στους πίνακες της προηγούμενης σελίδας;

2. Ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις μας δίνουν τα ονόματα των αθλητών που πήραν τουλάχιστον ένα χρυσό μετάλλιο (το \bowtie συμβολίζει φυσική συνένωση);

$\pi_{name}(\sigma_{result='Gold'}(\text{Athletes} \bowtie \text{Event_Results}))$

$\pi_{name}(\text{Athletes} \bowtie \sigma_{result='Gold'}(\text{Event_Results}))$

$\pi_{name}(\sigma_{result='Gold'}(\text{Athletes} \bowtie \pi_{athlete_id,result}(\text{Event_Results})))$

$\pi_{name}(\text{Athletes}) \bowtie \sigma_{result='Gold'}(\text{Event_Results})$

$\pi_{name}(\text{Athletes}) - \pi_{name}(\text{Athletes} \bowtie \sigma_{result \neq 'Gold'}(\text{Event_Results}))$

Άσκηση

ΠΡΟΤΙΜΑ(Π-ΠΟΤΗΣ, Π-ΜΠΥΡΑ)

ΣΥΧΝΑΖΕΙ(ΣΥ-ΠΟΤΗΣ, ΣΥ-ΜΑΓАЗΙ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΣΕ-ΜΑΓАЗΙ, ΣΕ-ΜΠΥΡΑ)

1. Τους πότες που προτιμούν τη μπύρα «Guinness»
2. Τους πότες που συχνάζουν σε μαγαζιά που σερβίρουν μπύρα «Guinness»
3. Τα μαγαζιά που σερβίρουν μπύρα «Guinness» **ή** μπύρα «Leffe Brune» **ή** και τα δύο
4. Τα μαγαζιά που σερβίρουν μπύρα «Guinness» **και** μπύρα «Leffe Brune»
5. Τα μαγαζιά που σερβίρουν μπύρα «Guinness» **αλλά όχι** μπύρα «Leffe Brune»
6. Τα μαγαζιά που σερβίρουν **μόνο** μπύρα «Guinness»
7. **Μαγαζιά που σερβίρουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές μπύρες.** (μόνο ένα είδος;)
8. **Μαγαζιά που σερβίρουν ακριβώς δύο διαφορετικές μπύρες.** (παραπάνω από δύο;)
9. **Τα μαγαζιά που σερβίρουν μπύρες που προτιμά ο πότης «Δημήτρης».**
10. **Τα μαγαζιά που σερβίρουν όλες τις μπύρες που προτιμά ο «Δημήτρης».**

ΠΡΟΤΙΜΑ(Π-ΠΟΤΗΣ, Π-ΜΠΥΡΑ)

ΣΥΧΝΑΖΕΙ(ΣΥ-ΠΟΤΗΣ, ΣΥ-ΜΑΓАЗΙ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΣΕ-ΜΑΓАЗΙ, ΣΕ-ΜΠΥΡΑ)

ΣΥΧΝΑΖΕΙ

ΣΥ-ΠΟΤΗΣ ΣΥ-ΜΑΓАЗΙ

Δημήτρης Ζυθοπωλείο

Δημήτρης BeeRock

Κώστας Ζυθοπωλείο

Κατερίνα GreenRose

Κατερίνα Lancelot

Μαρία BeeRock

Μαρία Lancelot

Άννα Ζυθοπωλείο

ΠΡΟΤΙΜΑ

Π-ΠΟΤΗΣ Π-ΜΠΥΡΑ

Δημήτρης Guinness

Δημήτρης Αμστελ

Μαρία Corona

Κώστας Fix

Κώστας Leffe Brune

Κώστας Guinness

Κατερίνα Leffe Brune

Μαρία Fix

Άννα Kaiser

Μαρία Guinness

Δημήτρης Corona

ΣΕΡΒΙΡΕΙ

ΣΕ-ΜΑΓАЗΙ ΣΕ-ΜΠΥΡΑ

Ζυθοπωλείο Guinness

Ζυθοπωλείο Αμστελ

BeeRock Fix

BeeRock GreenRose

Lancelot Fix


GreenRose Guinness

GreenRose Leffe Brune

GreenRose Fix

Ερωτήσεις;

Παράδειγμα



Παράδειγμα

Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει

Ας μετονομάσουμε τα γνωρίσματα της σχέσης Παίζει σε Παίζει-Τίτλος και Παίζει-Έτος ώστε να μπορούμε να τα διακρίνουμε από τα αντίστοιχα γνωρίσματα της σχέσης Ταινία

Παίζει1('Όνομα-Ηθοποιού, Παίζει-Τίτλος, Παίζει-Έτος) ←
Παίζει('Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος)

Παράδειγμα

Ταινία	Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
	Παραμύθι	1990	90	Έγχρωμη
	Παραμύθι	1930	120	Ασπρόμαυρη
	Φυγή	2000	98	Ασπρόμαυρη
	Άνοιξη	1998	101	Έγχρωμη

Παίζει	Όνομα-Ηθοποιού	Παίζει-Τίτλος	Παίζει-Έτος
	Αλίκη Παππά	Παραμύθι	1930
	Μαρία Γεωργίου	Παραμύθι	1990
	Κώστας Χρήστου	Φυγή	2000
	Μαρία Στεργίου	Άνοιξη	1998

Παράδειγμα

Ταινία

Ταινία.	Ταινία.	Διάρκεια	Είδος	Παίζει1	Παίζει-Τίτλος	Παίζει-Έτος
Παραμύθι	1990	90	Έγχρωμη	Αλίκη Παππά	Παραμύθι	1930
Παραμύθι	1930	120	Ασπρόμαυρη	Μαρία Γεωργίου	Παραμύθι	1990
Φυγή	2000	98	Ασπρόμαυρη	Κώστας Χρήστου	Φυγή	2000
Άνοιξη	1998	101	Έγχρωμη	Μαρία Στεργίου	Άνοιξη	1998
				Κατερίνα Αποστόλου	Φυγή	2000

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος	Όνομα-Ηθοποιού	Παίζει-Τίτλος	Παίζει-Έτος
Παραμύθι	1990	90	Έγχρωμη	Αλίκη Παππά	Παραμύθι	1930
Παραμύθι	1990	90	Έγχρωμη	Μαρία Γεωργίου	Παραμύθι	1990
Παραμύθι	1990	90	Έγχρωμη	Κώστας Χρήστου	Φυγή	2000
Παραμύθι	1990	90	Έγχρωμη	Μαρία Στεργίου	Άνοιξη	1998
Παραμύθι	1990	90	Έγχρωμη	Κατερίνα Αποστόλου	Φυγή	2000
Παραμύθι	1930	120	Ασπρόμαυρη	Αλίκη Παππά	Παραμύθι	1930
Παραμύθι	1990	120	Ασπρόμαυρη	Μαρία Γεωργίου	Παραμύθι	1990
Παραμύθι	1930	120	Ασπρόμαυρη	Κώστας Χρήστου	Φυγή	2000
Παραμύθι	1930	120	Ασπρόμαυρη	Μαρία Στεργίου	Άνοιξη	1998
Παραμύθι	1930	120	Ασπρόμαυρη	Κατερίνα Αποστόλου	Φυγή	2000
Φυγή	2000	98	Ασπρόμαυρη	Αλίκη Παππά	Παραμύθι	1930
...						

Παράδειγμα

Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει

π 'Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος $(\sigma_{\text{Παίζει-Τίτλος}} = \text{Τίτλος} \text{ AND } \text{Παίζει-Έτος} = \text{Έτος}(\text{Παίζει1} \times (\sigma_{\text{Είδος}} = \text{"έγχρωμη"} (\text{Ταινία})))$

π 'Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος $(\text{Παίζει1} \triangleright \triangleleft \text{Παίζει-Τίτλος} = \text{Τίτλος} \text{ AND } \text{Παίζει-Έτος} = \text{Έτος}(\sigma_{\text{Είδος}} = \text{"έγχρωμη"} (\text{Ταινία}))$

Παράδειγμα

Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει

π 'Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος $(\sigma_{\text{Είδος} = \text{"έγχρωμη"} \text{ AND } \text{Παίζει-Τίτλος} = \text{Τίτλος} \text{ AND } \text{Παίζει-Έτος} = \text{Έτος} (\text{Παίζει1} \times \text{Ταινία}))$

ή

π 'Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος $(\sigma_{\text{Παίζει-Τίτλος} = \text{Τίτλος} \text{ AND } \text{Παίζει-Έτος} = \text{Έτος} (\text{Παίζει1} \times (\sigma_{\text{Είδος} = \text{"έγχρωμη"} (\text{Ταινία})))))$

Παράδειγμα

Για κάθε ηθοποιό το όνομα και τον τίτλο-έτος για όλες τις έγχρωμες ταινίες στις οποίες παίζει

π 'Όνομα-ηθοποιού, Τίτλος, Έτος $(\sigma_{\text{Παίζει.τίτλος}} = \text{Τίτλος} \text{ AND } \text{Παίζει.έτος} = \text{Έτος})$
 $(\text{Παίζει1} \times (\sigma_{\text{Είδος}} = \text{"έγχρωμη"}) \text{ (Ταινία)})$

π 'Όνομα-ηθοποιού, Τίτλος, Έτος $(\text{Παίζει1} \triangleright \triangleleft_{\text{Παίζει.τίτλος} = \text{Τίτλος} \text{ AND } \text{Παίζει.Έτος} = \text{Έτος}} (\sigma_{\text{Είδος}} = \text{"έγχρωμη"}) \text{ (Ταινία)})$

π 'Όνομα-Ηθοποιού, Τίτλος, Έτος $(\text{Παίζει} * (\sigma_{\text{Είδος}} = \text{"έγχρωμη"}) \text{ (Ταινία)})$

είναι η τρίτη έκφραση πριν την προβολή ισοδύναμη των άλλων δύο;

Παραδείγματα

- Τις ταινίες (όλα τα γνωρίσματα) που γυρίστηκαν το 2005
- Μόνο τον τίτλο των ταινιών που γυρίστηκαν το 2005
- Τους ηθοποιούς (ονόματα) που έπαιξαν σε ταινίες που γυρίστηκαν το 2005
- Τους ηθοποιούς (ονόματα) που έπαιξαν σε ταινίες που γυρίστηκαν το 2005, αλλά δεν έπαιξαν σε καμία ταινία που γυρίστηκε το 2004
- Για κάθε ηθοποιό το όνομα του και τον τίτλο-έτος για όλες τις (έγχρωμες) ταινίες στις οποίες παίζει μαζί με τον σύζυγο του/της

Διαίρεση (παράδειγμα)

παράδειγμα: Βρες τον ηθοποιό που παίζει σε όλες (σε κάθε) ταινία που παίζει και ο George Clooney.

S: Όλες τις ταινίες που παίζει ο George Clooney

Q: Οι ηθοποιοί που (το όνομα τους) εμφανίζονται στη σχέση Παίζει (R) με υπόλοιπα γνωρίσματα να παίρνουν όλες τις τιμές του S

$S \leftarrow \pi_{\text{Τίτλος, Έτος}}(\sigma_{\text{Όνομα Ηθοποιού = George Clooney}}(\text{Παίζει}))$

$Q \leftarrow \text{Παίζει} \setminus S$

Χωρίς να χρησιμοποιήσω την πράξη της διαίρεσης;

Διαίρεση (παράδειγμα)

Παράδειγμα (εφαρμογή ισοδύναμης έκφρασης): Βρες τον ηθοποιό που παιζει σε όλες (σε κάθε) ταινία που παιζει και ο George Clooney.

Μια πλειάδα γ αποκλείεται από το αποτέλεσμα ανν όταν τις συνάψουμε μια τιμή x από το S , η πλειάδα $\langle y, x \rangle$ δεν ανήκει στο R

$$T_1 \leftarrow (\pi_Y(R) \times S) - R$$

$$Q \leftarrow \pi_Y(R) - \pi_Y(T_1)$$

$S \leftarrow \pi_{\text{Τίτλος, Έτος}}(\sigma_{\text{Όνομα - Ηθοποιού = George Clooney}}(\text{Παίζει}))$

$T_1 \leftarrow (\pi_{\text{Όνομα-Ηθοποιού}}(\text{Παίζει}) \times S) - \text{Παίζει}$ (μένουν μόνο οι ηθοποιοί που δεν παίζουν σε κάποια ταινία που παίζει ο Clooney!)

$Q \leftarrow \pi_{\text{Όνομα-Ηθοποιού}}(\text{Παίζει}) - \pi_{\text{Όνομα-Ηθοποιού}}(T_1)$

Παράδειγμα

A B

1 2

R

1 4

2 1

6 5

S

B ' C

2 3

2 5

1 4

R x S

R ▷◁_{A ≥ B} S

R ▷◁_{A = B} S

Μοντέλο Ο/Σ συμβολισμοί

