

# 1 Ανάπτυγμα Taylor

Υπενθυμίζουμε εδώ το ανάπτυγμα Taylor συναρτήσεων μίας και δύο μεταβλητών. Η γενίκευση σε περισσότερες μεταβλητές είναι πολύ εύκολη.

## 1.1 Συναρτήσεις μίας μεταβλητής

Έστω  $I \subset \mathbb{R}$  ένα διάστημα,  $n \in \mathbb{N}_0$ , και  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  μια συνάρτηση που είναι  $n + 1$  φορές συνεχώς παραγωγίσιμη στο διάστημα  $I$ . Έστω  $x_0 \in I$ .

Τότε, για κάθε  $x \in I$ , υπάρχει ένα σημείο  $\vartheta = \vartheta(x)$  μεταξύ των  $x_0$  και  $x$ , τέτοιο ώστε να ισχύει

$$(1) \quad f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(x - x_0)^i}{i!} f^{(i)}(x_0) + \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\vartheta).$$

Αυτός είναι ο *τύπος του Taylor* και το δεξιό του μέλος λέγεται *ανάπτυγμα Taylor* της συνάρτησης  $f$  στο σημείο  $x_0$ .

**Παρατήρηση 1.1** Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το ανάπτυγμα (1):

- Στην περίπτωση  $n = 0$  η σχέση (1) ανάγεται στον τύπο της μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού,  $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x)$ .
- Το  $\vartheta$  εξαρτάται από το  $x$  και μπορεί να γραφεί στη μορφή  $\vartheta = \lambda x + (1 - \lambda)x_0$  με κάποιο  $\lambda \in (0, 1)$ , είναι όπως λέμε ένας κυρτός συνδυασμός των  $x$  και  $x_0$ .
- Ας συμβολίσουμε με  $p_n(x)$  τον πρώτο όρο στο δεξιό μέλος της (1),

$$p_n(x) := \sum_{i=0}^n \frac{(x - x_0)^i}{i!} f^{(i)}(x_0).$$

Προφανώς το  $p_n$  είναι πολυώνυμο, βαθμού το πολύ  $n$ , και λέγεται *πολυώνυμο Taylor* της  $f$  στο σημείο  $x_0$ . Προσεγγίζουμε δηλαδή την  $f$  με ένα πολυώνυμο  $p_n$  και ο τελευταίος όρος στο δεξιό μέλος της (1) αποτελεί μια παράσταση του σφάλματος προσέγγισης  $f(x) - p_n(x)$ , το οποίο λέγεται και *υπόλοιπο* του τύπου του Taylor. Υπάρχουν και εναλλακτικές παραστάσεις του υπολοίπου.

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι  $p_n^{(i)}(x_0) = f^{(i)}(x_0)$ , για  $i = 0, \dots, n$ , δηλαδή οι παράγωγοι τάξης μέχρι  $n$  των συναρτήσεων  $p_n$  και  $f$  στο σημείο  $x_0$  συμπίπτουν – το  $p_n$  παρεμβάλλεται με αυτήν την έννοια στην  $f$  στο σημείο  $x_0$ .

- Αν το  $\vartheta$  δεν εξαρτάται από το  $x$ , τότε το δεξιό μέλος της (1) είναι πολυώνυμο βαθμού το πολύ  $n + 1$ . Συνεπώς, αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν και το αριστερό μέλος της (1), δηλαδή η συνάρτηση  $f$ , είναι πολυώνυμο βαθμού το πολύ  $n + 1$ . Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια η  $f^{(n+1)}$  είναι σταθερή συνάρτηση.
- Ο τελευταίος όρος στον τύπο (1) μηδενίζεται για κάθε  $x \in I$ , αν και μόνο αν η  $f$  είναι πολυώνυμο βαθμού το πολύ  $n$ .  $\square$

## 1.2 Συναρτήσεις δύο μεταβλητών

Έστω  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  ένα ανοικτό και κυρτό σύνολο, δηλαδή τέτοιο ώστε το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο οποιαδήποτε σημεία του  $\Omega$  να περιέχεται στο  $\Omega$ . Έστω  $n \in \mathbb{N}_0$ , και  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  μια συνάρτηση που είναι  $n + 1$  φορές συνεχώς παραγωγίσιμη στο  $\Omega$ , δηλαδή τέτοια ώστε όλες οι μερικές παράγωγοι της  $f$  τάξης μέχρι και  $n + 1$  να είναι συνεχείς. Έστω  $(x_0, y_0) \in \Omega$ .

Τότε, για κάθε  $(x, y) \in \Omega$ , υπάρχει ένα σημείο  $(\xi, \vartheta) = (\xi(x, y), \vartheta(x, y))$  στο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα  $(x, y)$  και  $(x_0, y_0)$ , τέτοιο ώστε να ισχύει

$$(2) \quad f(x, y) = \sum_{\substack{i+j=0 \\ i,j \geq 0}}^n \frac{(x-x_0)^i(y-y_0)^j}{i!j!} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j}(x_0, y_0) + \sum_{i=0}^{n+1} \frac{(x-x_0)^i(y-y_0)^{n+1-i}}{i!(n+1-i)!} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^i \partial y^{n+1-i}}(\xi, \vartheta).$$

**Παρατήρηση 1.2** Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το ανάπτυγμα (2):

- Το σημείο  $(\xi, \vartheta)$  εξαρτάται από το  $(x, y)$  και μπορεί να γραφεί στη μορφή  $\begin{pmatrix} \xi \\ \vartheta \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (1 - \lambda) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ , με κάποιο  $\lambda \in (0, 1)$ .
- Ας συμβολίσουμε με  $p_n(x, y)$  τον πρώτο όρο στο δεξιό μέλος της (2),

$$p_n(x, y) := \sum_{\substack{i+j=0 \\ i,j \geq 0}}^n \frac{(x-x_0)^i(y-y_0)^j}{i!j!} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j}(x_0, y_0).$$

Προφανώς το  $p_n$  είναι πολυώνυμο δύο μεταβλητών, βαθμού το πολύ  $n$ , και λέγεται *πολυώνυμο Taylor* της  $f$  στο σημείο  $(x_0, y_0)$ . Προσεγγίζουμε δηλαδή την  $f$  με ένα πολυώνυμο  $p_n$  και ο τελευταίος όρος στο δεξιό μέλος της (2) αποτελεί μια παράσταση του υπολοίπου  $f(x, y) - p_n(x, y)$ .

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι  $\frac{\partial^{i+j} p_n}{\partial x^i \partial y^j}(x_0, y_0) = \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j}(x_0, y_0)$ , για  $i, j = 0, \dots, n$ , τέτοια ώστε  $i + j \leq n$ , δηλαδή οι μερικές παράγωγοι μέχρι τάξης  $n$  των συναρτήσεων  $p_n$  και  $f$  στο σημείο  $(x_0, y_0)$  συμπίπτουν – το  $p_n$  παρεμβάλλεται με αυτήν την έννοια στην  $f$  στο σημείο  $(x_0, y_0)$ .

- Αν το  $(\xi, \vartheta)$  δεν εξαρτάται από το  $(x, y)$ , τότε το δεξιό μέλος της (2) είναι πολυώνυμο βαθμού το πολύ  $n + 1$ . Συνεπώς, αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν και το αριστερό μέλος της (2), δηλαδή η συνάρτηση  $f$ , είναι πολυώνυμο βαθμού το πολύ  $n + 1$ . Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια οι  $\frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^i \partial y^{n+1-i}}$  είναι σταθερές συναρτήσεις.
- Ο τελευταίος όρος στον τύπο (2) μηδενίζεται για κάθε  $(x, y) \in \Omega$ , αν και μόνο αν η  $f$  είναι πολυώνυμο δύο μεταβλητών βαθμού το πολύ  $n$ .  $\square$